

## NAVODILO ZA UPORABO

### **Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v enem tednu, morate obiskati zdravnika.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Saridon in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Saridon
3. Kako jemati zdravilo Saridon
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Saridon
6. Dodatne informacije

Saridon®

paracetamol, propifenazon, kofein

- Zdravilne učinkovine so paracetamol, propifenazon in kofein. Ena tableta vsebuje 250 mg paracetamola, 150 mg propifenazona in 50 mg kofeina.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, hipromeloza, Esma Spreng®, koruzni škrob, smukec, magnezijev stearat in brezvodni koloidni silicijev dioksid.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Bayer Pharma d.o.o., Celovška 135, 1001 Ljubljana

### **Izdelovalec**

Bayer Santé Familiale, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard, Francija

## **1. KAJ JE ZDRAVILO SARIDON IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Saridon je kombinacija protibolečinskih (analgetičnih) in protivročinskih (antipiretičnih) učinkovin in majhne količine kofeina. Njegove sestavine so skrbno uravnotežene in zagotavljajo hitro in učinkovito ublažitev bolečine, ki traja nekaj ur.

Zdravilo Saridon uporabljamo za lajšanje bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine, migrena, nevralgija, nevritis (vnetje živca), pooperacijske in revmatične bolečine, ter pri vročinskih stanjih (gripa in podobno).

Zdravilo je na voljo v škatli z 10 tabletami.

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SARIDON**

**Ne jemljite zdravila Saridon, če:**

- ste preobčutljivi za (alergični na) paracetamol, propifenazon (ali druge pirazolone), kofein ali katero koli sestavino zdravila,
- imate hudo ledvično ali jetrno okvaro,
- imate prirojeno pomanjkanje glukoze-6-fosfat-dehidrogenaze (hemolitična anemija),
- imate porfirijo (motnja v presnovi porfirina),
- ste noseči ali dojite,
- imate okvaro kostnega mozga.

Zdravila Saridon ne smemo dajati dojenčkom in otrokom do 12 leta starosti.

**Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Saridon:**

- če imate blago oz. zmerno jetrno okvaro (npr. alkoholiki) zaradi pomanjkanja glukuronil transferaze, jemljite zdravilo Saridon le z zdravnikovim privoljenjem. Toksičnost običajnega odmerka zdravila Saridon je v takih primerih namreč močno zvečana. Odmerek bo morda treba prilagoditi;
- če imate astmo, kronični nahod ali koprivnico, zlasti če ste preobčutljivi za druge protivnetne učinkovine.

Stalno jemanje analgetikov (za zdravljenje glavobola) lahko privede do kroničnega glavobola in trajno poškoduje ledvice.

Zdravila, ki znižujejo telesno temperaturo, lahko prikrijejo okužbo.

Ne uživajte alkoholnih pijač, če jemljete analgetike, kot je zdravilo Saridon.

**Jemanje zdravila Saridon skupaj s hrano in pijačo**

Saridon tablete lahko vzamete kadarkoli.

**Nosečnost in dojenje**

*Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

Zdravila Saridon med nosečnostjo in dojenjem ne smete jemati.

**Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi zdravilo Saridon na splošno pomembno vplivalo na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

**Jemanje drugih zdravil**

*Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.*

To je še posebno pomembno, če jemljete uspavala, antiepileptike, prokinetike (npr. metoklopramid), zdravila proti strjevanju krvi ali aidsu (zidovudin).

**3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SARIDON**

Vzemite 1 do 2 tableti naenkrat, mladostniki od 12 do 16 leta pa 1 tableto, največ 3-krat v 24 urah, če je treba.

Tableto pogoltnite celo z zadostno količino tekočine (npr. s kozarcem vode).

Analgetikov ne smemo jemati dalj časa ali v odmerkih, ki so večji od priporočenih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

*Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

**Če ste vzeli večji odmerek zdravila Saridon, kot bi smeli**

*Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Preveliki odmerki lahko povzročijo predvsem slabost, bruhanje, hitro utripanje srca in jetrno okvaro, ki je lahko usodna.

**Če ste pozabili vzeti zdravilo Saridon**

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

#### **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

*Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Saridon neželene učinke.*

Včasih se lahko pojavijo preobčutljivostne kožne reakcije, kot so izpuščaji ali koprivnica.

Zelo redko se lahko pojavijo srbenje, angioedem, oteženo dihanje in anafilaktični šok, še posebno pri bolnikih, nagnjenih k tem pojavom (glejte posebna opozorila). Če opazite take učinke, prenehajte z jemanjem zdravila Saridon in nemudoma obiščite zdravnika.

Poročajo tudi o posameznih primerih zmanjšane števila belih krvnih teles (levkopenije) in krvnih ploščic (trombocitopenije).

*Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

#### **5. SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI ZDRAVILA SARIDON**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

**Rok uporabnosti**

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

**Način izdaje**

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

#### **6. DODATNE INFORMACIJE**

Za dodatne informacije se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet: Bayer Pharma d.o.o., Celovška 135, 1001 Ljubljana.

**Datum zadnje revizije navodila**  
21.03.2005