

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!*

*To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

*Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*

*Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*

*Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v treh dneh, morate obiskati zdravnika.*

## **ASPIRIN<sup>®</sup> migran**

**acidum acetylsalicylicum**

**šumeče tablete**

*Zdravilna učinkovina je:* acetilsalicilna kislina

*Pomožne snovi so:* natrijev dihidrogencitrat, natrijev hidrogenkarbonat, brezvodna citronska kislina, brezvodni natrijev karbonat

Tableta vsebuje 543 mg natrija.

*Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:* Bayer Pharma d. o. o.  
Celovška 135  
1001 Ljubljana

*Ime in naslov izdelovalca:* Bayer Bitterfeld GmbH, 06803 Greppin, Nemčija.

Aspirin migran je na voljo v škatli z 12 šumečimi tabletami (6 x 2 šumeči tableti v dvojnem traku).

### **1. Kaj je zdravilo Aspirin migran in za kaj se uporablja**

1 šumeča tableta vsebuje 500 mg acetilsalicilne kisline.

Acetilsalicilna kislina spada v skupino nesteroidnih protivnetnih zdravil z analgetičnim, antipiretičnim in protivnetnim delovanjem.

Aspirin migran se uporablja za akutno zdravljenje glavobola pri napadih migrene z avro in brez nje.

### **2. Kaj morate vedeti preden vzamete zdravilo Aspirin migran**

Aspirina migran ne smete uporabljati:

- pri znani preobčutljivosti za acetilsalicilno kislino in druge salicilate ali katero od pomožnih snovi,
- pri zvečani nagnjenosti h krvavitvam,
- pri razjedi na želodcu ali dvanajstniku,

- zadnje tri mesece nosečnosti.

O uporabi Aspirina migran se morate nujno posvetovati z zdravnikom, če

- ste preobčutljivi za druga protivnetna zdravila, antirevmatike ali druge alergenske snovi,
- imate astmo,
- se hkrati zdravite z zdravili, ki vsebujejo kortikosteroide ali z drugimi protibolečinskimi ali protivnetnimi zdravili,
- se hkrati zdravite z antikoagulantni ali z zaviralci agregacije trombocitov (zdravila, ki preprečujejo strjevanje krvi), z zdravili za zniževanje vrednosti sladkorja v krvi (če imate sladkorno bolezen), z zdravili za izločanje sečne kisline, z zdravili, ki zmanjšujejo zadrževanje vode v telesu ali z zdravili za zniževanje krvnega tlaka,
- imate jetrne ali ledvične težave,
- imate v anamnezi bolezni prebavil,
- jemljete metotreksat, digoksin, barbiturate, litij, valprojsko kislino, fenitoin ali sulfonamide.

Sočasno uživanje alkoholnih pijač zveča nevarnost krvavitve iz prebavil.

*Če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, četudi ste ga dobili brez recepta, morate to povedati svojemu zdravniku.*

Če jemljete preparate z acetilsalicilno kislino, se morate pred vsakim kirurškim posegom posvetovati z zdravnikom oziroma zobozdravnikom.

Opozorilo: Zdravilo vsebuje natrij, kar bi lahko bilo škodljivo za vas, če ste na dieti z malo natrija.

*Nosečnost, dojenje*

*Preden vzamete katerokoli zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Aspirina migran ne smete jemati v zadnjih treh mesecih nosečnosti. O uporabi Aspirina migran v prvih šestih mesecih nosečnosti ali med dojenjem se posvetujte z zdravnikom.

*Otroci*

Zaradi možnosti pojava Reyevega sindroma (redke, a hude bolezni) lahko zdravila, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino, uporabljate le po predhodnem zdravniškem posvetu.

### **3. Kako jemati Aspirin migran**

*Odrasli:* 2 šumeči tableti kot enkratni odmerek. Če napad ne popusti lahko odmerek ponavljate na 4-8 ur. Največji dnevni odmerek je 6 šumečih tablet in ga ne smete prekoračiti.

Dve šumeči tableti raztopite v kozarcu vode in popijte.

Zdravila Aspirin migran ne smete jemati več kot tri dni, ne da bi se o tem posvetovali z zdravnikom. Če simptomi ne izginejo, je treba premisliti o drugi obliki zdravljenja.

*Če ste vzeli večji odmerek zdravila kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

#### **4. Možni neželeni učinki**

*Kot vsa zdravila ima lahko tudi Aspirin migran neželene učinke.*

Možni neželeni učinki so: bolečine v želodcu, dispepsija, gastritis, slabost, bruhanje, driska, krvavitve iz prebavil, ki lahko povzročijo slabokrvnost, razjede želodca ali dvanajstnika, preobčutljivostne reakcije (npr. napadi težkega dihanja, kožne reakcije), zvečana nevarnost pojava krvavitev in zvečanje vrednosti transaminaz.

*Če opazite kateregakoli od zgoraj navedenih neželenih učinkov ali neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

#### **5. Shranjevanje in rok uporabnosti**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

***Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!***

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

**Datum zadnje revizije besedila: 9.4.2004**