



tovarna zdravil, d. d.
Novo mesto
Slovenija

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 2 do 5 tednih, morate obiskati zdravnika.

Daktarin^{zaščiteno ime} krema 20 mg/1 g
Miconazolum

Zdravilna učinkovina: mikonazolijev nitrat.

Pomožne snovi: makrogol, glikol stearat, makrogolglicerol oleat, tekoči parafin, butilhidroksianizol, benzojska kislina, prečiščena voda.

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Ime in naslov izdelovalca:

*KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija
v sodelovanju z Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgija*

1. Kaj je Daktarin in za kaj se uporablja

Sestava

1 g kreme vsebuje 20 mg mikonazolijevega nitrata.

Oprema

Zloženka s 30 g kreme v tubi.

Kako Daktarin deluje

Daktarin vsebuje mikonazol, ki deluje na glivice (na dermatofite in kandido) ter na nekatere bakterije (po Gramu pozitivne bacile in koke).

Kdaj Daktarin uporabljate

Z Daktarinom zdravimo:

- okužbe kože in nohtov (ki jih povzročajo glivice rodov *Candida*, *Trichophyton* in *Epidermophyton*),
- okužbe kože z glivicami *Pityrosporum orbiculare*,
- okužbe, ki jih sočasno povzročajo glivice in bakterije ter glivične okužbe, ki so se jim kasneje pridružile tudi okužbe z bakterijami (s po Gramu pozitivnimi bacili in koki - *Staphylococcus* in *Streptococcus* spp.).

2. Kaj morate vedeti, preden začnete uporabljati Daktarin

Kdaj Daktarina ne smete uporabljati

Daktarina ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi za mikonazol ali katerokoli drugo sestavino zdravila.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Krema ne sme priti v oči.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Mikonazol skozi kožo zelo malo prehaja v kri. Če ste noseči ali doječa mati, se o uporabi kreme kljub temu posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi mikonazol vplival na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila

Opozorite zdravnika ali farmacevta, če jemljete kakšno drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Poročil o medsebojnem delovanju zdravil pri lokalni uporabi mikonazola ni.

Posebna opozorila o pomožnih snoveh

Butilhidroksianizol draži oči, kožo in mukozne membrane.

Benzojska kislina blago draži kožo, oči in mukozne membrane. Lahko poveča verjetnost zlatenice pri novorojenčkih.

3. Kako uporabljate Daktarin

Odmerjanje in način uporabe

Kremo nanesite na prizadeto mesto in okolico dvakrat na dan, navadno zjutraj in zvečer. S prsti jo narahlo vtrite v kožo. Zdravljenje naj traja 2 do 5 tednov. Z njim morate nadaljevati še nekaj dni (10 dni) po prenehanju vseh znakov, da preprečite ponovno obolenje.

Če znaki vašega obolenja v tem času ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaužitje kreme lahko povzroči slabost, bruhanje in drisko.

4. Neželene učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Daktarin neželene učinke.

Krema redko povzroči dražec ali pekoč občutek na koži in preobčutljivostne reakcije, zlasti srbenje in kožne izpuščaje. Tedaj prekinite zdravljenje.

Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Shranjevanje

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Datum zadnje revizije navodila

26.4.2002