



tovarna zdravil, d. d.  
Novo mesto  
Slovenija

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!  
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

*Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*

*Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*

*Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 2 do 4 tednih, morate obiskati zdravnika.*

**Daktarin<sup>zaščiteno ime</sup> oralni gel 100 mg/5 g  
Miconazolium**

*Zdravilna učinkovina: mikonazol.*

*Pomožne snovi: glicerol, želatiniran škrob, prečiščena voda, polisorbitat 20, aroma pomaranče, aroma kakava, 96 odstotni etanol, natrijev saharinat.*

*Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:*

*KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija*

*Ime in naslov izdelovalca:*

*KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija  
v sodelovanju z Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgija*

## **1. Kaj je Daktarin in za kaj se uporablja**

### **Sestava**

5 g oralnega gela (1 žlička) vsebuje 100 mg mikonazola.

1 g oralnega gela vsebuje 20 mg mikonazola.

### **Oprema**

Zloženka s 40 g oralnega gela v tubi.

### **Kako Daktarin deluje**

Daktarin vsebuje mikonazol, ki deluje na glivice (na dermatofite in kandido) ter na nekatere bakterije (po Gramu pozitivne bacile in koke).

### **Kdaj Daktarin uporabljate**

Z Daktarinom zdravimo:

- okužbe ustne votline in prebavil, ki jih povzročajo glivice rodu *Candida*.

## **2. Kaj morate vedeti, preden začnete uporabljati Daktarin**

### **Kdaj Daktarina ne smete uporabljati**

Daktarina ne smete uporabljati v naslednjih primerih:

- Če ste preobčutljivi za mikonazol ali katerokoli drugo sestavino zdravila.

- Če imate zdravstvene težave z jetri.
- Ko se sočasno zdravite z zdravili, ki jih imenujemo terfenadin, astemizol ali cisaprid.

### **Previdnostni ukrepi in opozorila**

Posebno previdni bodite pri dajanju oralnega gela dojenčkom in majhnim otrokom. Predpisani enkratni odmerek oralnega gela lahko zapre zgornji del dihalne poti (grlo) in povzroči težave pri dihanju. Zato ga dajajte previdno, razdeljenega v več manjših odmerkov, v usta in ne potiskajte v grlo.

### **Nosečnost in dojenje**

*Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

Mikonazol skozi prebavila zelo malo prehaja v kri. Če ste noseči ali doječa mati, se o uporabi oralnega gela kljub temu posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi mikonazol vplival na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

### **Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila**

Opozorite zdravnika ali farmacevta, če jemljete kakšno drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Med Daktarinom in nekaterimi drugimi zdravili lahko pride do medsebojnega učinkovanja, zaradi česar se zmanjša ali poveča učinek enega ali drugega zdravila. Preden pričnete jemati Daktarin, obvestite svojega zdravnika, če jemljete naslednje zdravila:

- zdravila za zaviranje imunskega odziva (ciklosporin, takrolimus),
- zdravila proti strjevanju krvi (antikoagulant),
- zdravila za zdravljenje epileptičnih napadov (fenitoin, fenobarbital),
- zdravila za zdravljenje malignih obolenj (citostatiki),
- zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni (peroralni hipoglikemiki),
- zdravila za zdravljenje preobčutljivostnih reakcij (terfenadin, astemizol),
- zdravila, ki pospešujejo peristaltiko v prebavilih (cisaprid).

## **3. Kako uporabljate Daktarin**

### **Odmerjanje in način uporabe**

Za odrasle in otroke je dnevni odmerek 200 mg razdeljen tako, da vzamete oralni gel štirikrat na dan po pol žlice. Oralni gel zadržite v ustih nekaj minut, nato ga pogoltnite. Priporočljivo je z oralnim gelom čez noč premazati tudi zobno protezo.

Za dojenčke je dnevni odmerek 100 mg razdeljen na štiri odmerke na dan po četrt žlice.

Dojenčkom in majhnim otrokom predpisani enkratni odmerek oralnega gela razdelite v več manjših odmerkov, dajte v usta in ne potiskajte v grlo.

Zdravljenje naj traja 2 do 4 tedne. Z njim morate nadaljevati še 2 dni po prenehanju vseh znakov, da preprečite ponovno obolenje.

Če znaki vašega obolenja v tem času ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

*Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

### **Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja**

*Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

Prevelik odmerek oralnega gela lahko povzroči slabost, bruhanje in drisko. Zdravnik bo odredil ustrezne ukrepe zdravljenja.

#### **4. Neželeni učinki**

*Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Daktarin neželene učinke.*

Oralni gel lahko povzroči blage prebavne težave (slabost, bruhanje, drisko) in preobčutljivostne reakcije. Tedaj prekinite zdravljenje.

*Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

#### **5. Shranjevanje in rok uporabnosti**

##### **Rok uporabnosti**

*Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.*

##### **Shranjevanje**

***Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!***

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

##### **Način izdajanja zdravila**

*Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.*

##### **Datum zadnje revizije navodila**

26.4.2002