



tovarna zdravil, d. d.
Novo mesto
Slovenija

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 14 dneh, morate obiskati zdravnika.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Atifan in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Atifan
3. Kako uporabljati zdravilo Atifan
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Atifan
6. Dodatne informacije

Atifan krema 10 mg/1 g
terbinafinum

- Zdravilna učinkovina je terbinafin.
- Pomožne snovi so natrijev hidroksid, benzilalkohol, sorbitan stearat, cetilpalmitat, cetilalkohol, stearilalkohol, polisorbitat 60, izopropilmiristat, prečiščena voda.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

1. KAJ JE ZDRAVILO ATIFAN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

1 g kreme vsebuje 10 mg terbinafinijevega klorida. Na voljo je škatla s 15 g kreme v tubi.

Krema je bela in homogena.

Terbinafin je protiglivična zdravilna učinkovina (antimikotik), ki glivice uničuje ali zavira njihovo razmnoževanje. Preprečuje in zdravi obolenja, ki jih povzročajo glivice različnih vrst (dermatofiti – *Trichophyton* spp., *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*; kvasovke – *Candida* spp. ter *Malassezia furfur*, poznana tudi kot *Pityrosporum ovale* ali *Pityrosporum orbiculare*). Učinkovit je pri lokalnih obolenjih kože.

Z Atifanom zdravimo glivične okužbe kože na stopalih (tinea pedis), po telesu (tinea corporis) in v predelu dimelj (tinea cruris), ki jih povzročajo dermatofiti, ter glivične okužbe kože (candidiasis cutanea, pityriasis (tinea) versicolor), ki jih povzročajo kvasovke.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO ATIFAN

Zdravila Atifan ne smete uporabljati:

- če ste preobčutljivi za terbinafin ali druge sestavine zdravila.

Posebna opozorila pri uporabi zdravila Atifan

Zdravila ne smete zaužiti.

Krema ne sme priti v stik z očmi.

Starejšim osebam odmerka ni treba prilagajati.

Izkušenj pri lokalnem zdravljenju otrok s terbinafinom je zelo malo.

Nosečnost

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Predklinične raziskave pri živalih niso pokazale neželenih učinkov na nosečnost in razvoj plodu.

Ker so podatki o klinični uporabi Atifana pri nosečnicah zelo omejeni in popolna varnost zdravila med nosečnostjo ni potrjena, se o uporabi kreme posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Terbinafin v zelo majhni količini prehaja v materino mleko, zato se o uporabi kreme posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Med dojenjem zdravila ne nanašajte na prsi.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Terbinafin nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Poročil o medsebojnem delovanju zdravil pri lokalni uporabi terbinafina ni.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO ATIFAN

Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajni odmerki zdravila Atifan

Kremo enkrat do dvakrat na dan, odvisno od vrste obolenja, v tankem sloju nanesite na prizadeto mesto, ki ga pred tem temeljito očistite in osušite. Kremo na obolelem mestu in okrog njega nežno vtrite v kožo. Pri okužbah v pregibih pod prsmi, med prsti ter v predelu dimelj (ingvinalno) in zadnjice (interglutealno) namazano obolelo mesto zlasti ponoči prekrijte z gazo.

Obolenja kože	Trajanje zdravljenja
tinea pedis	1 teden
tinea corporis in tinea cruris	1 teden
candidiasis cutanea	1 teden
pityriasis versicolor	2 tedna

Krema Atifan ni primerna za otroke, mlajše od 5 let, razen če zdravnik presodi drugače.

Če znaki vašega obolenja v dveh tednih ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom.

Če menite, da je učinek Atifana premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Atifan, kot bi smeli

Čimprej se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pri dolgotrajnejši uporabi večjih količin kreme na večjih površinah kože terbinafin lahko prehaja v kri in povzroči znake prevelikega odmerjanja, kot so glavobol, slabost, bolečine v trebuhu in omotica.

Malo verjetno je, da bi zaužitje kreme povzročilo hujše neželene učinke. V takem primeru obiščite zdravnika, ki bo ustrezno ukrepal.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Atifan

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

Kremo nanesite vsak dan ob približno istem času. Če jo pozabite, jo nanesite takoj, ko je to mogoče; zaradi tega pa vam urnika odmerjanja ni treba spreminjati.

Učinki, ko prenehate uporabljati zdravilo Atifan

Čeprav znaki obolenja pogosto izginejo v nekaj dneh, je okužba morda še prisotna in se lahko ponovi, če zdravljenje prezkodaj prenehate.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Atifan neželene učinke.

Po lokalni uporabi terbinafina se redko pojavi srbenje ali pekoč občutek na koži. V takšnih primerih zdravljenja z Atifanom ni treba prekinjati.

Terbinafin zelo redko povzroči preobčutljivostne reakcije. Če se to zgodi, zdravilo prenehajte uporabljati in o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA ATIFAN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta.

Datum zadnje revizije

6. DODATNE INFORMACIJE

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

KRKA, tovarna zdravil, d. d.

Šmarješka cesta 6

SI-8501 Novo mesto

Tel: 07 331 21 11

info@krka.biz

Navodilo je bilo odobreno