

Spoštovani!

Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas! Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo. Če se znaki bolezni ne izboljšajo v sedmih do štirinajstih dneh ali se redno ponavljajo, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Navodilo vsebuje

1. Kaj je Pervivo® in za kaj se uporablja
2. Kaj morate vedeti, preden vzamete Pervivo®
3. Kako jemati Pervivo®
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti

PERVIVO® peroralna raztopina

Zdravilne učinkovine

1000 ml vsebuje vodno-etanolni izvleček mešanice naslednjih rastlinskih drog:

Curcuma zedoaria Rosc., radix	korenina kurkume zedoarije	1,380 g
Angelicae radix	korenina zdravilnega gozdnega korena	1,360 g
Fraxinus ornus L., exudatum	izloček malega jesena (mana)	1,360 g
Myrrha	mira	0,700 g
Carlina acaulis L., radix	korenina brezstebelne kompave	0,680 g
Gentianae radix	korenina rumenega svišča	0,500 g
Myristica fragrans Houtt., semen	seme pravega muškatočca (muškatni orešček)	0,280 g
Liquiritiae radix	korenina golostebelnega sladkega korena	0,170 g
Menyanthidis trifoliatae folium	list navadnega mrzličnika	0,120 g
Acorus calamus L., rhizoma	korenika pravega kolmeža	0,047 g
Anisi stellati fructus	plod zvezdastega janeža	0,046 g
Citrus aurantium subsp. amara Engl., pericarpium (in insula Curacao coluntur)	plodje grenkega pomarančevca (gojen na otoku Curacao)	0,038 g
Absinthii herba	zel pravega pelina	0,035 g
Citrus aurantium subsp. amara Engl., pericarpium	oplodje grenkega pomarančevca	0,031 g
Caryophylli flos	cvet dišečega klinčevca	0,030 g
Inula helenium L.,radix	korenina velikega omana	0,020 g
Piper cubeba L., fructus	plod kubebe (vrste poprovca)	0,017 g
Cnicus benedictus L., herba	zel benediktinke	0,015 g
Zingiberis rhizoma	korenika pravega ingverja	0,015 g
Langusa galanga (L.) Stuntz., rhizoma	korenika galange	0,014 g
Verbasci flos	cvet lučnika	0,014 g
Centaurii herba	zel navadne tavžentrože	0,013 g
Citrus sinensis Osbeck., pericarpium	oplodje pomarančevca	0,011 g
Achillea moschata Wulf., herba	zel mošusnega rmana	0,006 g
Iris germanica L., herba	korenika perunike	0,005 g
camphora racemica	racemna kafra	0,950 g
theriak	terjak	0,970 g

Terjak vsebuje:

Menthae piperithae folium, pulvis	list poprove mete v prahu
Salviae officinalis, folium, pulvis	list žajblja v prahu
Angelicae radix, pulvis	korenino zdravilnega gozdnega korena v prahu
Zingiberis rhizoma, pulvis	koreniko pravega ingverja v prahu
Myristica fragrans Houtt., semen, pulvis	seme pravega muškatočca (muškatni orešček) v prahu
invertosum (Glucosum, Fructosum, a.a.)	invertni sladkor
methylis parahydroxybenzoas natriicum	natrijev metilparahidroksibenzoat (E 219)
propylis parahydroxybenzoas natriicum	natrijev propilparahidroksibenzoat (E 217)

glycerolum
aroma mellis
aqua purificata

glicerol
aromo medu
prečiščeno vodo

Pomožne snovi

barvilo E150 d (amoniakalno sulfadni karamel), 96 odstotni etanol (alkohol), prečiščena voda.

Vsebnost etanola: cca. 0,32 g / ml

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet

Farmedica, d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana

Ime in naslov izdelovalca

Richard Bittner GmbH
A - 9344 Weitensfeld 183, Avstrija

1. Kaj je Pervivo® in za kaj se uporablja

Pervivo je zdravilo rastlinskega izvora, ki je namenjeno lajšanju prebavnih motenj.

- Vsebuje gorenčine in eterična olja stimulirajo prebavo in zato blažijo občutek polnosti, napenjanja in slabosti. Pospešujejo tvorjenje prebavnih sokov in vzpodbujajo praznjenje žolčnika, zato se Pervivo uporablja tudi pri blagih žolčnih težavah, npr. po zaužitju premastne hrane.
- Uporabljen zunanje PERVIVO blaži vnetje kože, usne sluznice in omili bolečine v sklepih.

Pakiranje

Pervivo® je na voljo v treh pakiranjih:

- v škatlici, ki vsebuje stekleničko z 50 ml raztopine
- v škatlici, ki vsebuje steklenico z 250 ml raztopine
- v škatlici, ki vsebuje steklenico z 500 ml raztopine

2. Kaj morate vedeti, preden vzamete Pervivo®

Previdnostni ukrepi in opozorila

PERVIVA ne uporabljajte:

- pri resnih okvarah jetrne, želodčne in žolčne funkcije: nenadne bolezenske spremembe v trebuhu, navadno z močnimi bolečinami (akutni abdomen), vnetna črevesna obolenja, sveže kirurške spojitve med posameznimi deli črevesja (anastomoze v črevesju), izrazita ali popolna zapora črevesja (ileus), želodčna razjeda (ulkusna bolezen)
- pri preobčutljivosti na katero od sestavin
- pri božjasti (epilepsiji), alkoholizmu ali pri možganskih poškodbah

Zdravilo vsebuje etanol (alkohol) zato ni primerno za otroke.

Glede opozoril preberite razdelek *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah raztopine Pervivo®*.

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Zaradi vsebovanega etanola (alkohola) je uporaba PERVIVA v nosečnosti in pri dojenju prepovedana.

Raztopina Pervivo® vsebuje 38-42 volumskih % etanola. Zaradi neželenih učinkov etanola (alkohola) preberite opozorila v razdelku *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah raztopine Pervivo®*.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zaradi vsebovanega etanola (alkohola) so pri uporabi PERVIVA reakcije pri upravljanju z vozili in stroji lahko upočasnjene.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah raztopine Pervivo®

Pervivo® vsebuje 38-42 volumskih % etanola. Vsak odmerek vsebuje do 1,6 g etanola (alkohola), ki škoduje osebam z boleznijo jeter, božjastjo (epilepsijo), poškodbami ali boleznimi možganov, alkoholikom, prav tako nosečnicam in majhnim otrokom. Lahko spremeni ali stopnjuje učinek drugih zdravil.

Če se pojavi resen neželeni učinek zdravila, se o tem nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo vsebuje invertni sladkor, ki je mešanica glukoze in fruktoze. Vsak odmerek vsebuje največ 5 mg glukoze. Vsak odmerek vsebuje tudi 1,6 g etanola (alkohola). Če Pervivo uživajo diabetiki, naj pri tem upoštevajo navedene podatke.

Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano, niti niso znane druge oblike interakcij. Pervivo® vsebuje 38-42 volumskih % etanola, zato zaradi medsebojnega delovanja z zaužitim etanolom (alkoholom) preberite opozorila v razdelku *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah raztopine Pervivo®*.

Prosimo, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katero koli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

3. Kako jemati Pervivo®

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, jemljite Pervivo® v skladu z navodili v nadaljevanju. Upoštevajte navodila za odmerjanje, sicer zdravilo ni popolnoma učinkovito.

Koliko raztopine Pervivo® lahko vzamete in kako pogosto

Peroralno:

Odrasli: 2 do 3 x dnevno zaužijte 1 čajno žlico (5 ml) nerazredčeno ali razredčeno z vodo ali z zeliščnim čajem (s približno 1 decilitrom), neodvisno od obroka hrane.

Pri vnetju ustne sluznice:

Odrasli: 3 x dnevno razredčite 3 čajne žličke raztopine v približno 1 decilitru vode in grgrajte.

Zunanje:

Odrasli: Če ni drugače predpisano, raztopino večkrat dnevno rahlo vtrite v kožo.

Kako dolgo jemljite Pervivo®

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, jemljite zdravilo glede na potrebo poljubno dolgo časa. Omejitev glede trajanja uporabe zdravila ni znana.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste zaužili velike količine zdravila, lahko pride do zastrupitve z etanolom (alkoholom). V tem primeru morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

Kaj storiti, če ste pozabili vzeti Pervivo®

Če ste pozabili vzeti Pervivo®, ga vzemite takoj, ko bo mogoče. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in nadaljujte zdravljenje po predpisani shemi.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Pervivo® neželene učinke.

Neželeni učinki se izjemoma lahko pojavijo v spodaj navedenih primerih:

- zaužitje previsokega odmerka pripravka zaradi vsebovanega etanola (alkohola) lahko vodi v slabost, bruhanje, drisko in glavobol.
- pri preobčutljivosti na katero od vsebovanih sestavin se lahko pojavi alergija.

Če se pojavijo omenjeni neželeni učinki, prenehajte jemati Pervivo® in se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjevanje

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri sobni temperaturi do 25°C, na temnem mestu.

Zdravila ne uporabljajte, če je bil varnostni mehanizem zaporke pred prvim odpiranjem odlomljen.

Rok uporabnosti

Datum izteka roka uporabnosti je naveden na ovojnini. Raztopine Pervivo® ne smete uporabljati po tem datumu.

Pervivo je uporaben do navedenega datuma izteka roka uporabnosti tudi po tem, ko je bila steklenička prvič odprta.

Način izdajanja

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodila

25.3.2004