



Calcium-Sandoz[®] forte šumeče tablete

Calcii lactogluconas, calcii carbonas



Sestava

Ena šumeča tableta vsebuje 2,94 g kalcijevega laktogluconata in 0,30 g kalcijevega karbonata, kar ustreza 500 mg ioniziranega kalcija.

Pomožni sestavini: saharin natrij, saharoza.

Lastnosti in delovanje

Kalcij je mineral, ki je nujno potreben za vzdrževanje elektrolitskega ravnovesja telesnih celic in tekočin, kar omogoča normalno delovanje mišic in živčevja. Sodeluje tudi pri vrsti drugih osnovnih procesov v telesu, na primer pri strjevanju krvi, sproščanju hormonov in delovanju encimov. Je nenadomestljiva sestavina kosti, izboljšuje pa tudi delovanje belih krvničk. Zdravljenje s kalcijem ima različne učinke. Pri osteoporozi blaži in odstranjuje bolečine ter tako omogoča večjo gibljivost bolnika. Na gladko mišičje deluje spazmolitično, omogoča remineralizacijo kosti ter zavira izločanje izcedka pri prehladu in nekaterih alergijskih obolenjih.

Indikacije

Dopolnilno zdravljenje osteoporoze različnega izvora (pomenopavzalne, starostne, nastale zaradi zdravljenja s kortikosteroidi, nastale po gastrektomiji ali imobilizaciji); preprečevanje demineralizacije kosti pred nastopom menopavze in po njem; dodatno zdravljenje osteomalacije in rahitisa; zdravljenje latentne tetanije (povečane vzdražnosti in krčev mišic zaradi električnega ali mehanskega draženja); nadomeščanje kalcija pri povečanih potrebah po njem med nosečnostjo, dojenjem in v dobi rasti; dodatno zdravljenje nekaterih alergijskih stanj.

Kontraindikacije

Preobčutljivost za sestavine zdravila, prevelika koncentracija kalcija v krvi, močno povečano izločanje kalcija v urinu, tvorba kamnov v sečnih poteh, hudo odpovedovanje delovanja ledvic, hipervitaminoza D.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Bolnikom, ki so nagnjeni k tvorbi ledvičnih kamnov, priporočamo, da med zdravljenjem s Calcium-Sandoz forte pijejo več tekočine. Svetujemo kontrole plazemskih koncentracij kalcija in fosforja.



Ena šumeča tableta Calcium-Sandoz forte vsebuje 0,27 g natrija in 0,87 g sladkorja, kar moramo upoštevati pri bolnikih z dieto z manj soli ter pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

Nosečnost in dojenje

Za nosečnice in doječe matere je zdravilo varno. Ni poročil o škodljivosti uporabe med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na psihofizične sposobnosti

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na psihofizično sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.

Interakcije

Šumeče tablete Calcium-Sandoz forte lahko zmanjšajo učinek tetraciklinov, bifosfonatov, kinolonov, kalcijevih antagonistov, fenitoina ali fluoridov. Če bolnik jemlje ta zdravila hkrati s tabletami Calcium-Sandoz forte, mora upoštevati najmanj triurni presledek med zaužitjem obeh zdravil.

Sočasno jemanje šumečih tablet Calcium-Sandoz forte in peroralnih pripravkov železa zmanjša absorpcijo slednjih. Zaradi nevarnosti, da bi prišlo do prevelike koncentracije kalcija v krvi, bolniki med zdravljenjem s kalcijem ne smejo jemati velikih odmerkov vitamina D, razen če zdravnik tako predpiše.

Sočasno jemanje šumečih tablet Calcium-Sandoz forte in zdravil za preprečevanje zanositve lahko ob nenadni prekinitvi jemanja tablet Calcium-Sandoz forte zmanjša učinek zdravil za preprečevanje zanositve.

Če jemljemo Calcium-Sandoz forte istočasno s tiazidnimi diuretiki, se poveča tveganje za nastanek hiperkalcemije.

Kalcij poveča učinek digitalisa, zato je potrebna previdnost pri bolnikih, ki sočasno jemljejo šumeče tablete Calcium-Sandoz forte in zdravila z digitalisom.

Odmerjanje in uporaba

Osteoporoza - začetno zdravljenje: 2 tableti dvakrat na dan.



Osteoporozna - nadaljevalno zdravljenje: po 3 do 6 tednih od začetka zdravljenja zmanjšamo dozo na 2 tableti na dan.

Druge indikacije: 1 do 4 tablete na dan.

Otroci: do 10 let 1 tableta na dan,
nad 10 let 2 tableti na dan.

Šumečo tableto raztopimo v kozarcu vode in popijemo.

Preveliko odmerjanje

Poročil o akutnem predoziranju ni. Preveliki odmerki bi lahko povzročili prebavne motnje, ne pa prevelikega povečanja koncentracije kalcija v krvi; razen pri bolnikih, ki bi sočasno jemali zelo velike odmerke vitamina D. Pri teh bolnikih bi lahko prišlo tudi do hiperkalcemije, pojava kamnov v sečilnih ter kalcinacij mehkih tkiv.

V teh primerih zmanjšamo odmerke ali začasno prekinemo jemanje zdravila ob skrbnem zdravniškem nadzoru.

Stranski učinki

Redko se lahko pojavijo prebavne motnje (napetost, driska, zaprtje, slabost, bruhanje, flatulenca), hiperkalcemija, hiperkalcemija, hiperfosfatemija ter, ob nagli prekinitvi jemanja zdravila, povratna hiperacidnost.

Shranjevanje in uporabnost

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka uporabnosti, navedenem na ovojniini.

Shranjujte zaščiteno pred vlago pri temperaturi do 25 °C.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Izdajanje zdravila

Zdravilo izdajamo tudi brez zdravniškega recepta.

Oprema

Zloženka z 20 šumečimi tabletami v plastični foliji.

Ime in naslov proizvajalca

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija,
v sodelovanju z Novartis Pharma Ltd., Švica.

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet z zdravilom

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila 12.12.2001

