



*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!*

*To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

*Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*

*Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*

*Če bolečine ne izginejo v 10 dneh oz. se povišana temperatura ne zniža v 3 dneh, morate obiskati zdravnika.*

# Nalgesin<sup>®</sup> S

Naproxenum *filmsko obložene tablete 275 mg*

*Zdravilna učinkovina je: naproksen natrij.*

*Pomožne snovi: povidon, mikrokristalna celuloza, smukec, magnezijev stearat, metilhidroksipropilceluloza, titanov dioksid (E 171), makrogol, indigotin (E 132).*

*Ime in naslov izdelovalca in imetnika dovoljenja za promet:*

*KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija*

## 1. Kaj je Nalgesin S in za kaj se uporablja

**Sestava**

1 filmsko obložena tableta vsebuje 275 mg naproksen natrija.

**Oprema**

Zloženka z 10 filmsko obloženimi tabletami v pretisnem omotu.

**Kako Nalgesin S deluje**

Nalgesin S je zdravilo za lajšanje različnih bolečin in vnetja ter zniževanja povišane telesne temperature.

Protibolečinsko, protivnetno in protivročinsko deluje z zaviranjem tvorbe

prostaglandinov. Tablete so zelo dobro topne, zato začnejo zelo hitro delovati.

**Kdaj Nalgesin S uporabljate**

Nalgesin S olajša:

- glavobol in zobobol,
  - bolečine v mišicah, sklepih in hrbtenici,
  - migreno,
  - menstrualne bolečine,
  - bolečine v mišicah in sklepih, ki spremljajo prehladna in gripozna obolenja.
- Nalgesin S zniža povišano telesno temperaturo in ublaži vnetne procese.

## 2. Kaj morate vedeti preden uporabite Nalgesin S

**Nalgesina S ne smete uporabljati**

- če ste alergični na naproksen ali druge sestavine zdravila,
- če imate rano na želodcu ali dvanajesterniku ali ulcerozni kolitis,
- če ste kdaj krvaveli iz želodca,
- sočasno z drugimi zdravili za lajšanje bolečine,
- več kot 10 dni za lajšanje bolečine,
- več kot 3 dni za zniževanje povišane telesne temperature.

Nalgesina S ne dajajte otrokom, mlajšim od 12 let, razen če je tako odločil zdravnik.

Pred uporabo Nalgesina S se morate posvetovati z zdravnikom:

- kadar je boleči predel rdeč ali otekel,
- če redno jemljete druga zdravila,
- če ste pod zdravniškim nadzorom zaradi kake kronične bolezni,
- če ste imeli resne neželene učinke po kakem drugem zdravilu za lajšanje bolečin.

Jemanje Nalgesina S morate prekiniti in se posvetovati z zdravnikom:

- če se pojavijo novi ali nepričakovani simptomi,
- če se simptomi nadaljujejo ali celo poslabšajo,
- če imate težave s požiranjem,
- če se pojavi zgaga ali bolečina v želodcu.

**Previdnostni ukrepi in opozorila**

Če redno pijete alkoholne pijače (tri ali več kozarcev na dan), se o jemanju Nalgesina S posvetujte z zdravnikom. Nalgesin S lahko ob sočasnem pitju alkohola poveča nevarnost želodčne krvavitve.





Če ste že jemali druga zdravila za zdravljenje bolečine ali zniževanje povišane telesne temperature in ste pri tem dobili koprivnico, oteklino obraza, astmatični napad ali celo šok, ne jemljite Nalgesina S brez posveta z zdravnikom.

Ena tableta Nalgesina S vsebuje približno 25 mg natrija. To morate upoštevati, če lahko uživate le omejene količine soli.

#### Nosečnost in dojenje

*Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

V zadnjih treh mesecih nosečnosti in med dojenjem odsvetujemo jemanje Nalgesina S.

#### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi naproksen pomembno zmanjšal psihofizične sposobnosti za upravljanje vozil ali strojev.

#### Medsebojno učinkovanje zdravil

Če jemljete kaka druga zdravila, tudi če ste jih dobili brez recepta, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 3. Kako uporabljate Nalgesin S

#### Odmerjanje in način uporabe

Vzemite 1 tableto vsakih 8 do 12 ur, dokler trajajo simptomi, to pomeni največ 3 tablete na dan.

Začetni odmerek je lahko dvojen, tableti lahko vzamete naenkrat ali enournim presledkom.

Če ste starejši od 65 let, vzemite 1 tableto vsakih 12 ur, razen če se niste drugače dogovorili s svojim zdravnikom.

Tableto Nalgesin S vzemite s kozarcem vode.

*Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

#### Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja

*Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

### 4. Neželeni učinki

*Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Nalgesin S neželene učinke.*

Lahko se pojavijo bolečine v trebuhu, bruhanje, slabost, vrtoglavica, občutek

prazne glave, omotičnost, utrujenost, motnje spanja, šumenje v ušesih, otekle noge. Vse to so blagi neželeni učinki, vendar če jih opazite, o tem obvestite svojega zdravnika.

Zelo redko se lahko pojavi krvavitev iz prebavil, otekanje obraza, koprivnica, astmatični napad ali omedlevica. To so zelo hudi neželeni učinki in potrebujete nujno zdravniško pomoč.

*Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

### 5. Shranjevanje in rok uporabnosti

#### Shranjevanje

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

#### Rok uporabnosti

*Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii.*

#### Način izdajanja zdravila

*Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.*

#### Datum zadnje revizije navodila

22.6.2001

