

Dojenčki:	Otroci, starejši od dveh let:	Odrasli:
50-100 ml/kg telesne mase: Uporabite tolikokrat, kot otrok lahko popije, vendar v manjših količinah.	50-150 ml/kg telesne mase	20-40 ml/kg telesne mase

Priporočamo, da raztopino uporabljate, dokler traja driska in/ali rehidracija. To je le splošno priporočilo. Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če simptomi ne izginejo, se ponovno posvetujte z zdravnikom.

POVPREČNA SESTAVA

	Za 200 ml = 1 vrečka (6,6 g)		Za 100 g praška
Energijska vrednost	91,4 kJ		1384 kJ
	21,9 kcal		331 kcal
Glukoza	3,2 g		49,1 g
Maltodekstrini	1,9 g		29,4 g
Natrij	276 mg	(12 mEq)	4,2 g
Kalij	156 mg	(4 mEq)	2,4 g
Klor	426 mg	(12 mEq)	6,5 g
Citrat	379 mg	(6 mEq)	5,7 g
Osmolarnost	245 mOsmol / l		

Proizvaja: UP INTERNATIONAL, Švica
Zastopnik in uvoznik: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

HYDRANOVA

Dietetično živilo za posebne zdravstvene namene
v primeru dehidracije pri dojenčkih, malih otrocih in odraslih

10 vrečk po 6,6 g

SESTAVINE

Glukoza, maltodekstrini, natrijev klorid, trikalijev citrat, naravna aroma pomaranče, citronska kislina

POMEMBNO OPOZORILO

Živilo uporabljajte samo pod zdravniškim nadzorom.
Ne uporabljajte ga za hranjenje zdravih dojenčkov in otrok.
Novalac Hydranove ne smete uporabljati kot edini vir hrane.

UPORABA

Hydranovo priporočamo pri obvladovanju akutne driske in/ali zmerne dehidracije pri dojenčkih, otrocih in odraslih.

NAVODILA ZA PRIPRAVO

Prašek ene vrečke (6,6 g) raztopite v 200 ml ohlajene prekuhane vode v sterilizirani steklenički za hranjenje ali v čistem kozarcu.

Pripravljeno raztopino lahko uporabite toplo ali hladno in jo lahko shranjujete v hladilniku do 24 ur. Po 24 urah zavržite preostanek ali celotno pripravljeno raztopino.

Po posvetu z zdravnikom je treba dojenčku čimprej uvesti nazaj normalno prehrano. Najboljša je uporaba mleka Novalac.

- Izdelek je uporaben najmanj do datuma, ki je odtisnjen na dnu škatle in na posamezni vrečki.
- Hranite na suhem in hladnem mestu.
- Natančno upoštevajte navodila za pripravo. Vedno uporabite predpisano razredčitev. Ne dodajajte sladkorja ali soli.
- Novalac Hydranove ne smete uporabljati v primeru oslABLJENE funkcije ledvic, alkaloze, šoka, nezavesti, dolgotrajnega bruhanja, anurije (onemogočeno izločanje urina) ali sladkorne bolezni.
- Dehidracija zaradi driske ali bruhanja je pri dojenčkih, malih otrocih in starejših ljudeh lahko nevarna, zato vedno poiščite zdravniško pomoč.

ODMERJANJE**PRIPOROČENA KOLIČINA /24 UR**