

Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!

To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 dneh, morate obiskati zdravnika.



zrnca za peroralno raztopino

Paracetamol, Acidum ascorbicum

**Za topli napitek
proti vročini in bolečinam
pri gripi in prehladu**

Zdravilni učinkovini: paracetamol, askorbinska kislina.

Pomožne snovi: koruzni škrob, povidon, brezvodna citronska kislina, saharoza, natrijev saharinat, natrijev ciklamat, aroma grenivke in limone, kinolinsko rumeno barvilo (E 104).

Ime in naslov izdelovalca in imetnika dovoljenja za promet:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

1. Kaj je Daleron C in za kaj se uporablja

Sestava

5 g zrnca za peroralno raztopino (1 vrečka) vsebuje 500 mg paracetamola in 20 mg askorbinske kisline.

Oprema

Zloženka z 10 vrečkami po 5 g zrnca za peroralno raztopino.



Kako Daleron C deluje

Gripo in prehlad poleg nahoda, kašlja in vnete ustne sluznice pogosto spremljajo tudi bolečine in povišana telesna temperatura.

Zrnca Daleron C vsebujejo paracetamol in askorbinsko kislino (vitamin C). Paracetamol zavira sintezo prostaglandinov v centralnem živčnem sistemu ter tako znižuje povišano telesno temperaturo in blaži bolečino. Paracetamol ne draži želodčne sluznice, zato je primeren tudi za bolnike z želodčnimi težavami in razjedo na želodcu ali dvanajstniku. Daleron C vsebuje tudi vitamin C, ki krepi obrambne sposobnosti telesa in pripomore k hitrejši ozdravitvi, obenem pa izboljša okus zdravila. Zdravilo v obliki toplega napitka je zlasti primerno za bolnike z vneto sluznico ust in žrela, ker teže pogoltnjejo trdne zdravilne oblike.

Kdaj Daleron C uporabljate

Daleron C je primeren za:

- zniževanje povišane telesne temperature, ki spremlja različne bakterijske in virusne okužbe (viroze);
- blažitev bolečine v mišicah in sklepih pri prehladnih in gripoznih obolenjih;
- lajšanje blage do zmerno bolečine nevnetnega izvora (glavobol, zobobol), posebej pri bolnikih z želodčnimi težavami;
- lajšanje bolečine po poškodbah in zdravniških posegih.

2. Kaj morate vedeti, preden začnete uporabljati Daleron C

Kdaj Dalerona C ne smete uporabljati

Zrnca Daleron C ne smete jemati, če ste preobčutljivi za paracetamol, askorbinsko kislino ali za druge sestavine zdravila ali če imate hujske motnje v delovanju ledvic ali jeter.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Če imate blago do zmerno zmanjšano delovanje ledvic in jeter, smete jemati zrnca Daleron C le pod nadzorom zdravnika.

Priporočenih odmerkov ne smete prekoračiti.

Zrnca Daleron C ne smete jemati hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.

Previdnost pri uporabi je potrebna pri oslabeledih osebah, izčrpanih in alkoholikih.

Za otroke od 2. do 12. leta starosti priporočamo zrnca Daleron C junior, ker vsebujejo paracetamol v odmerkih, ki so primerni za otroke.

Zdravilo ni primerno za diabetike, ker vsebuje saharozo. 1 vrečka zrnca vsebuje 3,9 g saharoze.





Uporaba Dalerona C skupaj s hrano in pijačo

Če jemljete zrnca Daleron C, ne smete piti alkohola. Sočasno uživanje hrane zmanjša absorpcijo paracetamola, zato zdravilo jemljite pred obrokom hrane.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Varnosti uporabe paracetamola med nosečnostjo in dojenjem niso zanesljivo potrdili. Nosečnice in doječe matere naj zdravilo jemljejo le po predhodnem posvetu z zdravnikom in čim krajši čas, po možnosti samo posamezne odmerke.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na zmanjšanje sposobnosti za upravljanje vozil ali strojev.

Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila

Če sočasno jemljete druga zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Opozorite zdravnika, če jemljete zdravila, ki vsebujejo metoklopramid, domperidon, holestiramin ali varfarin. Zrnc Daleron C ne smete jemati sočasno z barbiturati, antiepileptiki, rifampicinom in kloramfenikolom.

Posebna opozorila o pomožnih snoveh

5 g zrnca Daleron C (1 vrečka) vsebuje 3,9 g saharoze. Če zdravilo jemljete v skladu z navodilom za odmerjanje, zaužijete z enkratnim odmerkom 3,9 g saharoze. Ker vsebuje saharozo, zdravilo ni primerno pri prirojeni intoleranci za fruktozo, pri glukoza-galaktoza malabsorpcijskem sindromu ali pri pomanjkanju saharozne izomaltaze.

3. Kako uporabljate Daleron C

Odmerjanje in način uporabe

Odraslim in otrokom od 12. leta dalje priporočamo po eno vrečko zrnca 4-krat do 6-krat na dan. Med posameznimi odmerki mora biti vsaj štiriurni presledek. V 24 urah smete vzeti največ 8 vrečk zrnca. Vsebinske vrečke stresite v kozarec, prelijte z 1,5 dl tople vode ali čaja, dobro premešajte in še toplo popijte.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.



Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, tudi če se počutite dobro; znaki zastrupitve se namreč lahko pojavijo šele čez nekaj dni. Preveliki odmerki paracetamola lahko zlasti pri bolnikih z ledvičnimi in jetrnimi obolenji povzročijo slabost, bruhanje in hudo jetrno okvaro.

Ukrepi v primeru izpuščenega odmerka

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Zrnca Daleron C jemljite le ob bolečinah ali povišani telesni temperaturi. Ko bolezenski znaki minejo, zdravilo prenehajte jemati.

4. Neželene učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Daleron C neželene učinke.

Ob jemanju priporočenih odmerkov so neželeni učinki redki in blagi. Občasno se lahko pojavijo slabost in preobčutljivostne kožne reakcije (izpuščaji, koprivnica, srbečica).

Če se pojavijo neželeni učinki, zdravilo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii.

Shranjevanje

Zdravilo shranjujte zaščiteno pred vlago pri temperaturi do 30 °C. **Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Datum zadnje revizije navodila

1.3.2002