

NAVODILO ZA UPORABO

STREPSILS BREZ SLADKORJA Z OKUSOM LIMONE 0,6 mg/1,2 mg pastile amilmetakrezol/diklorobenzilalkohol

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v sedmih dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone
3. Kako jemati zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO STREPSILS BREZ SLADKORJA Z OKUSOM LIMONE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Amilmetakrezol in diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Pastile Strepsils brez sladkorja z okusom limone so namenjene za ublažitev simptomov vnetega žrela in okužb v ustih in žrelu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO STREPSILS BREZ SLADKORJA Z OKUSOM LIMONE

Ne jemljite zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone

- Če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone.
- Otroci, mlajši od 5 let.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone

- Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ne prekoračite predpisanega odmerka.

Jemanje/uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone

Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO STREPSILS BREZ SLADKORJA Z OKUSOM LIMONE

Pri jemanju zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone natančno upoštevajte predpisano odmerjanje. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in otroci, starejši od 15 let: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite po eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Otroci med 8 in 15 let: 1 pastila 4-krat dnevno.

Otroci med 5 in 7 let: 1 pastila 3-krat dnevno.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Občasno se lahko pojavijo preobčutljivostne (alergijske) reakcije, ki vključujejo izpuščaj, pekoč občutek ali zbadanje v ustih in žrelu ter otekanje ust in žrela.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA STREPSILS BREZ SLADKORJA Z OKUSOM LIMONE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone

Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in diklorobenzilalkohol. 1 pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg diklorobenzilalkohola.

Pomožne snovi so: aroma limone, kinolinsko rumeno (E104), natrijev saharinat, vinska kislina, izomalt (E953), tekoči maltitol.

Izgled zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone in vsebina pakiranja

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone je na voljo v obliki rumenih, okroglih pastil s Strepsils "S" zaščitnim znakom na obeh straneh.

Na voljo so v škatli iz kartona s 16 pastilami (2 x 8 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji

PharmaSwiss d.o.o, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Navodilo je bilo odobreno

18.06.2009