

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!*

*To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

*- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*

*- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*

*- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v **treh dneh**, morate obiskati zdravnika.*

*To navodilo vsebuje:*

- 1. Kaj je zdravilo neo-angin N pastile in za kaj se uporablja*
- 2. Kaj morate vedeti, preden vzamete zdravilo neo-angin N pastile*
- 3. Kako jemati zdravilo neo-angin N pastile*
- 4. Možni neželeni učinki*
- 5. Shranjevanje in rok uporabnosti*

---

## neo-angin® N pastile

---

*Zdravilne učinkovine so: 2,4-diklorobenzil alkohol (alcoholum dichlorobenzylicum), amilmetakrezol (amylmetacresolum), levomentol (levomentholum).*

*Druge sestavine so: eterično olje janeža, eterično olje poprove mete, saharoza, tekoča glukoza, vinska kislina, rdeče 4R (E 124). Vsebnost glukoze: 1,1 g na pastilo. Vsebnost saharoze: 1,4 g na pastilo.*

*Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:*

Top Trade d.o.o., Cesta v Gorice 39, 1000 Ljubljana

*Ime in naslov izdelovalca zdravila: Za MCM Klosterfrau, Köln, Nemčija izdeluje Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH, Berlin, Nemčija*

### 1. Kaj je zdravilo neo-angin® N pastile in za kaj se uporablja

#### Sestava

Ena pastila vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

2,4-diklorobenzil alkohol	1,20 mg
amilmetakrezol	0,60 mg
levomentol	5,90 mg

#### Pakiranje

Škatlica s 24 pastilami – dva pretisna omota s po 12 pastilami.

#### Kako neo-angin N pastile delujejo in za kaj se uporabljajo

neo-angin N pastile so antiseptik in blag analgetik za žrelo. Namenjene so preprečevanju in zgodnjemu zdravljenju blagih okužb ust in žrela, s čimer se zmanjša tudi poraba antibiotikov. Te okužbe povzročijo različna vnetja, npr. vnetje tonzil (tonzilitis, angina), vnetje ustne sluznice (stomatitis, aftozni stomatitis, afte), vnetje dlesni (gingivitis), kataralno vnetje žrela (faringitis), kataralno vnetje grla (laringitis) in prehlad s simptomi, kakor so bolečine v žrelu, težave pri požiranju in hripavost. Zdravilo se lahko uporablja tudi preventivno pri nevarnosti gripe.

## 2. Kaj morate vedeti preden začnete jemati zdravilo neo-angin® N pastile

### Kdaj zdravila neo-angin® N pastile ne smete uporabljati

- pri preobčutljivosti (alergiji) za katerokoli sestavino zdravila.
- če ste bolnik z redko motnjo malabsorpcije glukoze in galaktoze.

### Previdnostni ukrepi in opozorila

- Zdravilo ni primerno za otroke do 4. leta starosti.
- Sladkorni bolniki bodite pozorni na vsebnost glukoze in saharoze v zdravilu. Količine so navedene pod naslovom »Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin® N pastile«.

### Uporaba zdravila neo-angin N pastile skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo neo-angin N pastile lahko jemljete neodvisno od obrokov hrane. Do danes ni poročil, da bi hrana in pijača kakorkoli vplivali na delovanje neo-angin N pastil.

### Nosečnost in dojenje

*Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

Zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoče povsem izključiti nevarnosti za plod, zato se morate pred uporabo tega zdravila posvetovati z zdravnikom. Pri predpisovanju tega zdravila nosečim ženskam je potrebna previdnost.

### Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Ni tovrstnih vplivov.

### Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin® N pastile

- Zdravilo vsebuje 1,1 g glukoze in 1,4 g saharoze na odmerek. Z vsakim odmerkom vzamete do 1,1 g glukoze ter do 1,4 g saharoze, če jemljete zdravilo v skladu z navodilom za odmerjanje. Zaradi vsebnosti saharoze zdravilo ni primerno za vas, če imate naslednje zdravstvene težave: intoleranco fruktoze, pri glukoza-galaktoza malabsorpcijskem sindromu ali pomanjkanju saharozne-izomaltaze.
- To zdravilo vsebuje barvilo E 124, ki lahko povzroči alergični tip reakcije, vključno z astmo. Alergične reakcije so pogostejše pri ljudeh, ki so preobčutljivi (alergični) na acetilsalicilno kislino.

### Uporaba drugih zdravil

Ni znano, da bi zdravilo neo-angin N pastile vplivalo na delovanje drugih zdravil.

## 3. Kako uporabljate zdravilo neo-angin N pastile

### Odmerjanje in način uporabe:

Odrasli in otroci, starejši od 6 let, na vsake 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite po eno pastilo. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Zaradi vsebnosti sladkorjev zdravilo lahko škoduje zobem.

Če se vaše težave po treh dneh jemanja zdravila ne izboljšajo ali se celo poslabšajo, morate obiskati zdravnika.

*Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

**Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja**

*Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se v primeru neželenih učinkov posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.*

neo-angin N pastile so varno zdravilo. Do danes ni znanih primerov posledic prevelikega odmerjanja tega zdravila. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Teoretično lahko pri prevelikem odmerjanju pričakujemo draženje ustne ali želodčne sluznice.

**Ukrepi v primeru izpuščenega odmerka**

*Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.*

**4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo neo-angin N pastile neželene učinke.

Kljub široki uporabi tega zdravila so o neželenih učinkih poročali zelo redko, in sicer le o draženju ustne ali želodčne sluznice. Teoretično so možne tudi alergijske reakcije.

Če se pojavi alergijska reakcija, prenehajte jemati pastile in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

*Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

**5. Shranjevanje in rok uporabnosti****Shranjevanje**

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

**Rok uporabnosti**

5 let - odtisnjen je na škatlici in pretisnem omotu.

*Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatlici in pretisnem omotu.*

**Način izdajanja zdravila**

*Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.*

**Navodilo je bilo odobreno**

07.02.2002