

NAVODILO ZA UPORABO

Septolete plus pastile
benzocainum, cetylpyridinii chloridum

**dvojni učinek
za boleče žrelo
antiseptik**

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 3 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Septolete plus in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Septolete plus
3. Kako jemati zdravilo Septolete plus
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Septolete plus
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO SEPTOLETE PLUS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Pastile Septolete plus delujejo lokalno protibolečinsko in protimikrobno. Na ta način razkužujejo ustno votlino in žrelo ter lokalno blažijo bolečino.

Pastile vsebujejo antiseptik cetilpiridinijev klorid, ki uničuje vrsto bakterij in glivic, v določeni meri pa tudi zavira razvoj virusov. Na ta način blaži vnetja v ustih in žrelu, predvsem pa preprečuje razvoj hujših bakterijskih vnetij. Cetilpiridinijev klorid zaradi dobre omočljivosti in znižanja površinske napetosti prodira tudi na težko dostopna mesta sluznice ust in žrela ter zavira rast bakterij.

Benzokain je lokalni anestetik, primeren za lajšanje bolečine pri požiranju, ki pogosto spremlja infekcije in vnetja v ustih in žrelu.

Pastile Septolete plus vsebujejo poliola maltitol in manitol. Ne vsebujejo sladkorja, ki ga bakterije potrebujejo za rast. Pastile Septolete plus so primerne za diabetike, ne kvarijo zob, učinek antiseptika pa je v brezsladkorni osnovi neprimerno boljši.

Pastile Septolete plus priporočamo za lajšanje bolečine in razkuževanje:

- pri blažjih infekcijah v ustni votlini in žrelu (faringitis, laringitis, začetek angine),
- pri vnetju dlesni in ustne sluznice (gingivitis, stomatitis) ter
- za zaščito pri prehladnih in gripoznih obolenjih.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SEPTOLETE PLUS

Ne jemljite zdravila Septolete plus:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) benzokain, cetilpiridinijev klorid ali katerikoli sestavino zdravila Septolete plus.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Septolete plus:

- če imate odprte rane v ustih, ker cetilpiridinijev klorid upočasni celjenje ran.
- če imate hujšo okužbo z visoko telesno temperaturo, glavobolom in bruhanjem, obiščite zdravnika, še posebno, če se težave po treh dneh ne izboljšajo.

- če ste diabetik, morate vedeti, da vsaka pastila vsebuje 1 g maltitola. Zaradi počasne hidrolize in absorpcije v prebavilih maltitol le malo vpliva na raven krvnega sladkorja. Septolet plus ne priporočamo otrokom, mlajšim od 6 let. Jemanje večjih odmerkov od predpisanih ni priporočljivo.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ni znano, da bi Septolette plus vplivale na učinke drugih zdravil.

Jemanje zdravila Septolette plus skupaj s hrano in pijačo

Septolet plus ne jemljite neposredno pred obrokom in hkrati z mlekom.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerikoli zdravilo.

O varnosti zdravila med nosečnostjo in dojenjem ni dovolj podatkov, zato jemanja v tem obdobju ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi pastile Septolette plus vplivale na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Septolette plus

Septolette plus vsebujejo maltitol. Če nekaterih sladkorjev ne prenašate, o tem obvestite svojega zdravnika.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SEPTOLETE PLUS

Pri jemanju zdravila Septolette plus natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajni odmerek za odrasle in otroke, starejše od 12 let, je do 8 pastil na dan. Po 1 pastilo raztopite v ustih vsake 2 do 3 ure.

Otrokom od 6. do 12. leta starosti priporočamo do 4 pastile na dan. Po 1 pastilo raztopite v ustih vsake 4 ure.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Septolette plus, kot bi smeli

Glede na količino učinkovin v eni pastili je možnost prevelikega odmerjanja minimalna. Zaužitje večje količine pastil lahko povzroči želodčno-črevesne težave, slabosti, bruhanja in driske. V takem primeru prenehajte jemati zdravilo, popijte veliko vode ali mleka in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Septolette plus

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Septolette plus neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če upoštevate priporočene odmerke se neželeni učinki pojavijo le redko. Pri občutljivih ljudeh jemanje večjih odmerkov od predpisanih lahko povzroči želodčno-črevesne težave zaradi draženja sluznice prebavil.

Zelo redko se lahko pojavijo znaki preobčutljivosti za zdravilo.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SEPTOLETE PLUS

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo in vlago pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila Septolete plus ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Septolete plus

- Zdravilni učinkovini sta benzokain in cetilpiridinijev klorid. Ena pastila vsebuje 5 mg benzokaina in 1 mg cetilpiridinijevega klorida.
- Pomožne snovi so eterično olje poprove mete, levomentol, tekoči maltitol, maltitol, manitol, glicerol, deviško ricinusovo olje, magnezijev stearat, brezvoden koloidni silicijev dioksid, povidon, farmacevtski voski (čebelji vosek, karnauba vosek, šelak), titanov dioksid (E171) in modro barvilo V (E131).

Izgled zdravila Septolete plus in vsebina pakiranja

Pastile so modre barve, okrogle, izbočene, svetleče.

Na voljo so škatle s 30 (3 x 10) in z 18 (2 x 9) pastilami v pretisnih omotih.

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo odobreno

23. 7. 2007

O-2887