

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Za lajšanje bolečin lahko zdravilo jemljete največ 10 dni, za zniževanje povišane telesne temperature pa največ 3 dni. Če se znaki vaše bolezni v tem času ne izboljšajo, morate obiskati zdravnika. Otrokom zdravila ne smete dajati več kot 3 dni brez posvetovanja z zdravnikom.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo *Panadol Extra* in za kaj se uporablja
2. Kaj morate vedeti, preden vzamete zdravilo *Panadol Extra*
3. Kako uporabljati zdravilo *Panadol Extra*
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti

PANADOL EXTRA filmsko obložene tablete (paracetamol, coffeinum)

Zdravilni učinkovini sta: paracetamol in kofein

Pomožne snovi so: predgelirani škrob, koruzni škrob, povidon, kalijev sorbat, smukec, stearinska kislina, premrežen natrijev karmelozat, triacetin in hipromeloza.

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:

GSK d.o.o., Ljubljana, Knezov štraton 90, 1001 Ljubljana.

Ime in naslov izdelovalca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Knockbrack, Dungarvan, Republika Irska.

1. Kaj je zdravilo *Panadol Extra* in za kaj se uporablja?

Sestava

1 filmsko obložena tableta vsebuje 500 mg paracetamola in 65 mg kofeina.

Kaj vsebuje pakiranje?

Škatla vsebuje 12 ali 24 filmsko obloženih tablet v pretisnem omotu.

Kako deluje *Panadol Extra*?

Panadol Extra vsebuje kombinacijo dveh učinkovin: paracetamola, ki je analgetik (blaži bolečine) in antipiretik (znižuje povišano telesno temperaturo) ter kofeina, ki dodatno lajša bolečine. *Panadol Extra* ne draži želodca.

Za kaj se uporablja *Panadol Extra*?

Panadol Extra hitro in učinkovito blaži glavobol, migreno, bolečine v hrbtu, zobobol, revmatske bolečine, bolečine v mišicah in bolečine ob menstruaciji. Izboljša počutje med prehladom, gripo in vnetjem grla ter znižuje povišano telesno temperaturo.

2. Kaj morate vedeti, preden vzamete *Panadol Extra*?

Zdravilo *Panadol Extra* ne smete jemati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol. Prav tako ga ne smete jemati, če ste preobčutljivi na paracetamol, kofein ali druge sestavine tega zdravila.

Bodite posebno pozorni pri uporabi, če:

- imate hudo ledvično ali jetrno bolezen. Pred jemanjem zdravila *Panadol Extra* se morate posvetovati s svojim zdravnikom.

Na kaj morate biti pozorni če jemljete druga zdravila:

- če jemljete metoklopramid, domperidon (proti slabosti in bruhanju) ali holestiramin (za zniževanje visoke ravni holesterola v krvi), se o primernosti jemanja zdravila *Panadol Extra* posvetujte s svojim zdravnikom,
- če jemljete antikoagulate (zdravila proti strjevanju krvi), hkrati pa potrebujete tudi sredstvo za lajšanje bolečin, lahko občasno vzamete tudi paracetamol.

Jemanje zdravila *Panadol Extra* skupaj s hrano in pijačo

Uživanje večjih količin kave ali čaja v času jemanja zdravila *Panadol Extra* lahko povzroči razdražljivost in napetost.

*Če ste noseči ali dojite, se morate pred uporabo zdravila *Panadol Extra* posvetovati s svojim zdravnikom ali farmacevtom.*

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo ne vpliva na sposobnost za vožnjo in upravljanje s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila *Panadol Extra*

Zdravilo vsebuje kalij, zato ga ne smete jemati, če ste na dieti z malo kalija. Lahko povzroči stanje hiperkaliemije. Pri peroralni aplikaciji lahko povzroči gastrointestinalne motnje.

3. Kako jemati *Panadol Extra*?

Odrasli in otroci, starejši od 12 let:

Priporočamo 1-2 tableti (500 do 1000 mg paracetamola) vsakih 4-6 ur. Zdravilo smete vzeti najpogosteje na vsake 4 ure. Posamezni odmerek ne sme biti večji kot 2 tableti (1000 mg paracetamola). Največji dnevni odmerek je 8 tablet (4000 mg paracetamola).
Otrokom, starim manj kot 12 let, zdravila *Panadol Extra* ne priporočamo.

Upoštevajte predpisani odmerek.

Če simptomi ne izginejo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ne prekoračite navedenega odmerka. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, takoj poiščite zdravniško pomoč, tudi če se ne počutite slabo, saj lahko prevelik odmerek paracetamola povzroči jetrno odpoved.

Če ste pozabili vzeti zdravilo

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Panadol Extra neželene učinke. Neželeni učinki paracetamola so redki. Lahko se pojavijo alergične reakcije, npr. kožni izpuščaji. Uživanje večjih količin kave ali čaja v času jemanja zdravila Panadol Extra lahko povzroči razdražljivost in napetost.

Če opazite kakršnekoli neobičajne učinke, prenehajte jemati zdravilo in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Pogoji shranjevanja: Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Rok uporabnosti: Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je označen na pakiranju.

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Datum zadnje revizije navodila

10. december 2004.

Panadol je blagovna znamka skupine podjetij GlaxoSmithKline.