

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Canesten raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Canesten raztopina
3. Kako uporabljati zdravilo Canesten raztopina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Canesten raztopina

Canesten[®] raztopina

clotrimazolum

Zdravilna učinkovina je klotrimazol.

Pomožne snovi so: makrogol 400, izopropilalkohol, propilenglikol

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Bayer d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Nemčija

1. KAJ JE ZDRAVILO CANESTEN RAZTOPINA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Canesten raztopina je na voljo v škatli z 1 plastičnim vsebnikom po 20 ml raztopine z zaporko s kapalko.

1 ml raztopine vsebuje 10 mg klotrimazola.

Klotrimazol, učinkovina Canestena, je imidazolov derivat s širokim spektrom protimikoznega delovanja.

Klotrimazol deluje na glivice tako, da zavira nastajanje ergosterola. Posledica tega so strukturne in funkcionalne okvare citoplazemske membrane.

Raztopino Canesten uporabljamo za zdravljenje glivičnih okužb kože, ki jih povzročajo dermatofiti, kvasovke, plesni in drugi mikroorganizmi.

Take okužbe so: tinea pedum (glivična okužba stopal), tinea manuum (glivična okužba rok), tinea corporis, tinea inguinalis (glivična okužba kože trupa in udov ter kožnih gub), pityriasis versicolor (okužba rožene plasti kože), eritrazma (blago, kronično, površinsko vnetje kože).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CANESTEN RAZTOPINA

Ne uporabljajte zdravila Canesten raztopina:

- če ste preobčutljivi za klotrimazol ali katerokoli sestavino zdravila Canesten raztopina. V tem primeru se pred uporabo zdravila posvetujte z zdravnikom.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Canesten raztopina:

- Raztopina Canesten vsebuje izopropilalkohol. Povzroči lahko draženje, zato ne priporočamo uporabe na sluznicah.
- Pazite, da zdravilo ne pride v stik z očmi.

Nosečnost

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Če raztopino Canesten uporabljate, kot je predpisano v navodilu ali kot vam je naročil zdravnik ali farmacevt, pojav sistemskih učinkov (učinkov na druge organe) ni verjeten, ker se klotrimazol ne absorbira skozi nepoškodovano ali vneto področje kože v krvni obtok. Kljub temu je njegova uporaba v prvih treh mesecih nosečnosti primerna le, če tako svetuje zdravnik. Raziskav o uporabi raztopine Canesten med nosečnostjo še ni.

Dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Doječe matere naj raztopine Canesten ne nanašajo na dojke.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CANESTEN RAZTOPINA

Zdravilo morate uporabljati tako, kot je predpisano v tem navodilu (razen če vam je zdravnik predpisal drugače). Če navodil ne boste natančno upoštevali, zdravilo ne bo pravilno delovalo.

Dva- do trikrat na dan nanesite na prizadete dele kože raztopino Canesten in jo previdno vtrite. Največkrat zadostuje nekaj kapljic za površino, veliko kot dlan. Prizadeto mesto pred nanosom raztopine temeljito umijte in posušite.

Trajanje zdravljenja je različno in odvisno od obsega in lokalizacije bolezni. Za popolno ozdravitev zdravljenja ne smete končati takoj, ko izginejo simptomi okužbe.

Ponovitev bolezni preprečite tako, da zdravljenje nadaljujete še dva tedna potem, ko so izginili vsi bolezenski znaki.

Simptomi običajno izginejo, če traja zdravljenje:

dermatomikoze	3 do 4 tedne
eritrazme	2 do 4 tedne
pityriasis versicolor	1 do 3 tedne.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Canesten raztopina, kot bi smeli:

Podatkov, da bi uporaba prevelike količine raztopine Canesten povzročila neželene učinke, ni.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Canesten raztopina:

Če ste pozabili na odmerek zdravila, naj naslednji zato ne bo večji.

Učinki, ko prenehate uporabljati zdravilo Canesten raztopina:

Če želite glivično okužbo popolnoma pozdraviti in preprečiti njeno ponovitev, zdravljenja ne smete končati brez posvetovanja z zdravnikom. Če se za to vseeno odločite, tvegate, da se bo bolezen ponovila. Zdravljenja ne smete končati takoj, ko izginejo simptomi okužbe, ampak ga morate nadaljevati, kot je predpisano v tem navodilu.

Kaj še lahko naredite za zdravljenje okužbe?

Perilo, oblačila in brisače, ki pridejo v stik s prizadetim delom, je treba zamenjati vsak dan. To bo pomagalo pri zdravljenju in preprečilo okužbo drugih delov telesa in drugih ljudi.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Canesten raztopina neželene učinke.

Pojavijo se lahko preobčutljivostne reakcije, bolečina, srbenje in kožni izpuščaji.

Če se naštetih neželenih učinkov pojavijo prvič ali če se stanje poslabša, raztopino Canesten prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CANESTEN RAZTOPINA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Način izdajanja zdravila:

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Navodilo je bilo odobreno: 17.9.2007