

# **Navodilo za uporabo PARAGIN<sup>®</sup> oralne raztopine**

## **Sestava oralne raztopine**

100 ml etanolno-vodne (70 %V/V etanol) oralne raztopine vsebuje učinkovine iz: 2 g cvetov kamilice (*Chamomillae flos*), 2 g cvetov arnike (*Arnicae flos*), 5 g listov žajblja (*Salviae folium*), 2g listov oreha (*Juglandis folium*), 4 g korenike kolmeža (*Calami rhizoma*) in 4 g korenike srčne moči (*Tormentillae rhizoma*). Raztopini je dodano še 0.5 % V/V eteričnega olja poprove mete (*Menthae piperitae aetheroleum*). Raztopina vsebuje najmanj 0.9 % čreslovin.

## **Delovanje**

Izvleček navedenih drog deluje antiseptično, protivnetno in adstringentno.

## **Terapevtske indikacije**

Vnetja obzobnih tkiv, predvsem vnetja dlesni, vnetja ustne sluznice, krvavenje dlesni, sluznični otiščanci zaradi protez, ustni zadah; preventivno za nego in krepitev dlesni in ustne sluznice, proti majavosti zob.

## **Kontraindikacije**

Preobčutljivost na arniko in mentol ali katerokoli drugo sestavino pripravka.

## **Stranski učinki**

Možne so alergične reakcije na sestavine v arniki in na mentol. V primeru suma se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## **Način dajanja in odmerjanje**

Paragin<sup>®</sup> oralno raztopino uporabljamo za pripravo ustne vode (kopeli) ali pa jo nanesimo direktno na zobno ščetko (okrog 5 kapljic) in z njo masiramo dlesni. To masažo lahko kombiniramo z umivanjem zob.

Za pripravo ustne vode kanemo okrog 10 kapljic raztopine v pol kozarca mlačne vode in si z njo oplaknemo usta (žvrkljamo in grgramo). Te kopeli so primerne za blaženje sprememb ob vnetih in krvavečih dlesnih, vneti ustni sluznici in pri težavah ob uporabi zobnih protez. Ustna voda je koristna ustni higieni kadilcev, lahko pa jo uporabljamo tudi v zobnih prhah.

Redne masaže in kopeli s Paragin<sup>®</sup> oralno raztopino (2-3 krat dnevno ali po glavnih obrokih) krepijo ustno sluznico in dlesni ter tako prispevajo k negi in vzdrževanju zdravia ustne votline.

## **Posebna opozorila**

Paragin<sup>®</sup> oralna raztopina ni namenjena dojenčkom ali malim otrokom. Pri večjih otrocih, t.j. nad 10 let, sta način dajanja in omerjanja enaka kot pri odraslih. Uporaba raztopine pod pogoji, kot so navedeni, ni kontraindicirana v času nosečnosti in dojenja. Raztopina ni namenjena uživanju, morebiti zaužita pa v priporočenih odmerkih ne škoduje. Če zaužijete večje količine se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## **Pogoji shranjevanja**

Shranjujte zapro pri temperaturi do 25° C. Shranjujte nedosegljivo otrokom !

Izdeluje:

KOŽELJ d.o.o., Vegova 12, 1233 Dob pri Domžalah, Slovenija  
Tel/fax: 01/722 09 70

## **Rok uporabnosti**

Datum izteka uporabnosti je naveden na ovojniku. Po izteku tega datuma zdravila ne uporabljajte !

## **Oprema zdravila**

Steklenička z 20 ml oralne raztopine PARAGIN<sup>®</sup>.

**Datum zadnje revizije navodila: 21. 10. 1999**