

NAVODILO ZA UPORABO

Venoruton 20 mg/g gel okserutini

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Venoruton gel in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venoruton gel
3. Kako uporabljati zdravilo Venoruton gel
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Venoruton gel
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VENORUTON GEL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Venoruton gel sodi v skupino zdravil, ki se imenujejo pripravki za stabiliziranje kapilar (ščitijo žile in kapilare).

Zdravilo Venoruton gel zmanjšuje oteklino in ostale simptome kronične venske insuficience, npr. bolečine in težke noge ter bolečine po skleroterapiji ali med dolgimi letalskimi poleti. Zdravilo Venoruton gel se uporablja za blažitev bolečin in oteklin, nastalih zaradi poškodb, npr. zvina in mišične udarnine.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO VENORUTON GEL

Ne uporabljajte zdravila Venoruton gel

- če ste alergični na (preobčutljivi za) učinkovino okserutini ali katerokoli sestavino zdravila Venoruton gel

V tem primeru povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu, da zdravilo Venoruton gel ni primerno za vas.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Venoruton gel

Pri oteklinah spodnjih okončin zaradi srčnega, ledvičnega ali jetrnega odpovedovanja je potrebno zdravljenje osnovne bolezni. V teh primerih naj ne bi uporabljali zdravila Venoruton gel.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. Prve tri mesece nosečnosti zdravila Venoruton gel ne smete uporabljati, razen če zdravnik presodi, da korist zdravila odtehta možno tveganje.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Venoruton gel nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Venoruton gel

Zdravilo vsebuje benzalkonijev klorid, ki je dražeča snov in lahko povzroči kožne reakcije.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO VENORUTON GEL

Pri uporabi zdravila Venoruton gel natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Na prizadeto območje nanesite gel dvakrat dnevno in ga rahlo vtrite. Po potrebi lahko zdravilo Venoruton gel nanesete pod obvezo. Zdravnika obvestite, če se simptomi ne izboljšajo ali če se poslabšajo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Venoruton gel

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnjega.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Venoruton gel neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodaj navedeni neželeni učinki so razvrščeni glede na organske sisteme po pogostnosti:

| | |
|---------------|---|
| Zelo pogosti: | več kot 1 od 10 bolnikov |
| Pogosti: | manj kot 1 od 10, ampak več kot 1 od 100 bolnikov |
| Občasni: | manj kot 1 od 100, ampak več kot 1 od 1.000 bolnikov |
| Redki: | manj kot 1 od 1.000, ampak več kot 1 od 10.000 bolnikov |
| Zelo redki: | manj kot 1 od 10.000 bolnikov |

Bolezni imunskega sistema

Redki: preobčutljivostne kožne reakcije (simptomi izginejo ob prenehanju zdravljenja)

Če opazite takšne simptome, prenehajte uporabljati Venoruton gel in o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VENORUTON GEL

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Venoruton gel ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Venoruton gel

Zdravilna učinkovina:

1 g gela vsebuje 20 mg okserutinov.

Pomožne snovi: karbomer 980, 30 % natrijev hidroksid, natrijev edetat, benzalkonijev klorid in prečiščena voda.

Izgled zdravila Venoruton gel in vsebina pakiranja

Gel je homogen, prozoren do rahlo opalescenten, zlato rumene barve, brez vonja.

Na voljo je v škatli s tubo, ki vsebuje 40 g gela.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec:

Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Način in režim izdaje zdravila Venoruton gel

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Navodilo je bilo odobreno

12.10.2007