

COLDREX

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

*Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.
Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, morate obiskati zdravnika.*

Kaj vsebuje pakiranje?

12 ali 24 tablet *Coldrex* v pretisnem omotu.

Kaj vsebujejo tablete *Coldrex*?

1 tableta vsebuje 500 mg paracetamola, 25 mg kofeina, 5 mg fenilefrinijevega klorida, 20 mg terpin hidrata in 30 mg askorbinske kisline.

Zdravilo vsebuje tudi predgelirani škrob, koruzni škrob, smukec, stearinsko kislino, povidon, kalijev sorbat, natrijev lavrilsulfat in rumeno barvilo (E 110 – Eurocol sunset yellow).

Kako deluje zdravilo *Coldrex*?

Coldrex vsebuje paracetamol – analgetik (blaži bolečine) in antipiretik (znižuje povišano telesno temperaturo), fenilefrinijev klorid - dekonjestiv, ki odmaši nos in sinuse ter tako omogoči lažje dihanje, kofein - blago poživilo, terpin hidrat - ekspektorans, ki olajša izkašljevanje, in askorbinsko kislino (vitamin C), ki je običajna sestavina zdravil proti gripi in prehladu, saj pomaga nadomestiti vitamin C, ki se lahko izgubi v začetni stopnji obeh bolezni.

Kdo je imetnik dovoljenja za prodajo zdravila *Coldrex*?

GSK d.o.o., Ljubljana, Knezov štraton 90, 1001 Ljubljana.

Kdo izdeluje zdravilo *Coldrex*?

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Republika Irska.

Za kaj se uporabljajo tablete *Coldrex*?

Tablete *Coldrex* lajšajo simptome gripe in prehlada: mrzlico, zamašen nos, nahod, glavobol, bolečine v sinusih, bolečine pri vnetem grlu in ostale bolečine.

Kaj morate vedeti, preden vzamete tablete *Coldrex*?

Zdravila ne smete jemati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.

Tablet *Coldrex* prav tako ne smete jemati, če imate naslednje težave:

- preobčutljivost na paracetamol, fenilefrinijev klorid, kofein, terpin hidrat ali vitamin C;
- bolezni jeter;
- hude bolezni ledvic;
- povečano delovanje ščitnice;
- sladkorno bolezen;
- če se zdravite zaradi visokega krvnega pritiska;
- če se zdravite zaradi srčnih bolezni;
- če jemljete triciklične antidepresive;
- če se zdravite z beta blokatorji;

- če ste v zadnjih dveh tednih jemali zaviralce monoamino oksidaze.

Če ste noseči ali dojite, se morate o uporabi tablet *Coldrex* posvetovati z zdravnikom.

Vpliv na psihofizične sposobnosti

Zdravilo ne vpliva na sposobnost za vožnjo in upravljanje strojev.

Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila

Če jemljete tudi druga zdravila, se pred uporabo tablet *Coldrex* posvetujte z zdravnikom. O primernosti jemanja tablet *Coldrex* se posvetujte z zdravnikom, če jemljete metoklopramid, domperidon (za lajšanje težav pri slabosti in bruhanju) ali holestiramin (za zniževanje ravni holesterola v krvi).

Kako jemati tablete *Coldrex*?

Odrasli in otroci, stari 12 let ali več: Priporočamo 1-2 tableti vsakih 4-6 ur, vendar ne več kot 8 tablet v 24 urah. Zdravilo smete vzeti najpogosteje na vsake 4 ure.

Upoštevajte predpisani odmerek.

Če simptomi ne izginejo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ne prekoračite navedenega odmerka. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, takoj poiščite zdravniško pomoč, tudi če se ne počutite slabo, saj lahko prevelik odmerek paracetamola povzroči jetrno odpoved.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi *Coldrex* neželene učinke. Stranski učinki, ki jih povzroča paracetamol, so redki. Pojavijo se lahko alergijske reakcije, na primer kožni izpuščaji. Fenilefrin lahko povzroči slabost, glavobol, rahel dvig krvnega pritiska in zelo redko srčne palpitacije. Te težave so le prehodne. Uživanje velikih količin kave in čaja v času jemanja tablet *Coldrex* lahko poveča razdražljivost in napetost. Če opazite kakršnekoli neobičajne učinke, se posvetujte z zdravnikom.

Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte na suhem mestu.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Ne uporabljajte zdravila po preteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini!

Izdajanje zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Datum zadnje revizije besedila

23. maj 2005

Coldrex je blagovna znamka skupine podjetij GlaxoSmithKline.