

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7-14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina
3. Kako uporabljati zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina
6. Dodatne informacije

Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina

Echinacea purpurea: herba, recentis tinctura

Echinacea purpurea: radix, recentis tinctura

1. Kaj je zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina in za kaj ga uporabljamo

Kapljice Echinaforce® so zdravilo rastlinskega izvora, pripravljene iz sveže, cvetoče zeli in korenin škrlatne ehinaceje oziroma škrlatnega ameriškega slamnika.

Zdravilo povečuje imunsko odpornost telesa. Uporabljajte ga za preprečevanje prehlada in pospeševanje zdravljenja znakov prehlada kot so: kašelj, nahod, solzenje, vnetje žrela, glavobol in mišične bolečine.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina

Ne uporabljajte kapljic Echinaforce®

- če ste preobčutljivi na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov,
- če ste preobčutljivi na rastline iz družine košaric (latinsko Compositae), kot sta arnika in rman ali na ekstrakte iz njih,
- če imate napredujoče sistemske bolezni, na primer tuberkulozo, levkemijo, kolagenozo, multiplo sklerozo, AIDS, okužbo z virusom HIV in druge avtoimunske bolezni.

Bodite posebno pozorni pri uporabi kapljic Echinaforce®

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. Otroci, stari med 6 in 14 let, naj se pred uporabo kapljic Echinaforce® posvetujejo z zdravnikom. Če znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 do 14 dneh, morate obiskati zdravnika. To zdravilo vsebuje 65 odstotkov V/V etanola (alkohola). Preberite poglavje Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce®.

Uporaba drugih zdravil

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano. Kapljice Echinaforce® vsebujejo 65 % (V/V) etanola (alkohola), zato zaradi medsebojnega delovanja z zaužitim etanolom preberite opozorila v poglavju: Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce®.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate ali ste pred kratkim uporabljali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Uporaba kapljic Echinaforce® skupaj s hrano in pijačo

Kapljice zaužijte pol ure pred obrokom hrane.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

O škodljivosti kapljic Echinaforce med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov. V skladu s splošno medicinsko prakso odsvetujemo uporabo nosečnicam in doječim materam, če se pred tem niso posvetovale z zdravnikom. Kapljice Echinaforce® vsebujejo 65 % (V/V) etanola (alkohola), zato pogledajte opozorila v poglavju: Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce®.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, če se držite predpisanega odmerjanja.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce®

Kapljice Echinaforce® vsebujejo 65 odstotkov V/V etanola (alkohola), to je do 500 mg na odmerek, kar ustreza 12,6 ml piva oziroma 5,2 ml vina na odmerek. Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom. Na vsebnost etanola (alkohola) morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo.

Če bi se pojavil resen neželeni učinek zdravila, se o tem nemudoma posvetujte z zdravnikom. Zdravilo Echinaforce® je na voljo tudi brez alkohola, v obliki tablet.

3. Kako uporabljati zdravilo Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina

Pri uporabi kapljic Echinaforce® natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajni odmerek je:

- za odrasle in mladostnike nad 14 let: trikrat do petkrat dnevno 20 do 25 kapljic (0,6 do 0,8 ml),
 - za otroke, starejše od 6 let: trikrat dnevno po 10 kapljic (0,3 ml), po posvetu z zdravnikom.
- Z enim odmerkom otrok zaužije do 0,175 g etanola, zato ga je potrebno nujno razredčiti.

Raztopino nakapajte v pol kozarca vode in popijte. Zdravilo je primerno samo za peroralno uporabo. Kapljic Echinaforce® ne uporabljajte neprekinjeno več kot 8 tednov. Če menite, da je učinek kapljic Echinaforce® premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek kapljic Echinaforce®, kot bi smeli

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom. Do sedaj ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Če ste pozabili uporabiti kapljice Echinaforce®

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega. Nadaljujte zdravljenje po predpisani shemi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi kapljice Echinaforce neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.. V redkih primerih se lahko ob jemanju kapljic Echinaforce pojavi preobčutljivostna reakcija, na koži. Če jo opazite, takoj prenehajte jemati kapljice in o tem nemudoma obvestite zdravnika.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje zdravila Echinaforce® peroralne kapljice, raztopina

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Kapljice Echinaforce® shranjujte v originalnem vsebniku pri temperaturi med 15 in 25°C.

Kapljic ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte kapljic, če je bil varnostni mehanizem zaporke pred prvim odpiranjem odlomljen. Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebujejo kapljice Echinaforce®

1 ml raztopine vsebuje:

- 860 mg tinkture zeli sveže škrlatne ehinaceje (Echinacea purpurea: herba, recentis tinctura), razmerje droga: ekstrakcijsko topilo je 1 : 12; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol,
- 45 mg tinkture korenin sveže škrlatne ehinaceje (Echinacea purpurea: radix, recentis tinctura), razmerje droga : ekstrakcijsko topilo je 1 : 11; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol.

Pomožne snovi: prečiščena voda, etanol.

Vsebina pakiranja

Na voljo je pakiranje v škatli s stekleničko, v kateri je 50 ml raztopine in v škatli s stekleničko, v kateri je 100 ml raztopine.

Rok uporabnosti

Kapljic Echinaforce® ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je odtisnjen na ovojniku. Tinkture iz svežih rastlin se včasih lahko skalijo, vendar to ne vpliva na njihov učinek. Po prvem odpiranju stekleničke je rok uporabnosti zdravila 4 mesece.

Način in režim izdaje kapljic Echinaforce®

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/5240216, faks: 01/5240214, e-pošta: farmedica@farmedica.si

Proizvajalec

Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, Švica

Izdelovalca

Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000 Ljubljana
Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo odobreno: 25. 03. 2008