

*Pred uporabo zdravila natančno preberite to navodilo, ker vsebuje za Vas pomembne podatke. To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje manjših bolezenskih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, tako da Vam bo kar najbolj koristilo.*

*Navodilo shranite, morda ga boste želeli ponovno prebrati. Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije. Če se znaki Vaše bolezni ne izboljšajo v 5 dneh, morate obiskati zdravnika.*

## Navodilo za uporabo

### **Tantum Verde 3 mg pastile** benzydaminum

#### **Kaj je zdravilo Tantum Verde, pastile in zakaj se uporablja?**

1 pastila Tantum Verde vsebuje 3 mg zdravilne učinkovine benzidamonijevega klorida. Pomožne snovi so: 3,5 mg aspartama, izomaltoza, mentol, citronska kislina, arome limone, aroma poprove mete in barvili ( kinolinsko rumeno E 104 ter indigotin E 132 ).

#### **Farmacevtska oblika in vsebnost**

Farmacevtska oblika zdravila je pastila.  
2 x 10 pastil v omotu.

#### **Kako delujejo pastile Tantum Verde?**

Zdravilna učinkovina benzidamin deluje izrazito protivnetno in lokalno protibolečinsko. Spada med nesteroidne protivnetne učinkovine, v skupino s posebnim načinom delovanja. Hitro prodira v tkivo in tam odpravlja vnetje. Zato oteklina splahni, bolečine in težave pri požiranju hitro ponehajo. Pastile uporabljajte pri vnetjih in bolečinah v ustni votlini in žrelu.

**Imetnik dovoljenja za promet:** CSC Pharma d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana.

**Izdeluje:** Disch AG, Bahnhofstrasse 21, 5504 Othmarsingen, Švica / ACRAF Spa, Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Italija

#### **Kaj morate vedeti preden uporabite pastile Tantum Verde ?**

*Pastil ne smete uporabiti, če ste preobčutljivi na učinkovino benzidamin ali na katerokoli sestavino zdravila. Sladilo aspartam je vir fenilalanina.*

#### **Ali je varno uporabljati pastile Tantum Verde med nosečnostjo in dojenjem?**

Če pastile jemljete po navodilu, je uporaba med nosečnostjo možna, vendar zaradi nezadostnih izkušenj samozdravljenja med nosečnostjo in med dojenjem ne priporočamo.

*Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, kadar nameravate med nosečnostjo ali med dojenjem uporabiti katerokoli zdravilo.*

#### **Kaj morate poleg tega še upoštevati?**

Če s pastilami Tantum Verde v petih dneh niste dosegli pričakovanega uspeha in simptomi bolezni še trajajo ali se takoj povrnejo, se posvetujte z zdravnikom. Tudi kadar opazite nezaželene učinke ali če kdo po nesreči zaužije večjo količino pastil Tantum Verde ( na

primer otroci ), poiščite zdravniško pomoč.

### **Ali lahko uporabljate pastile Tantum Verde hkrati z drugimi zdravili?**

Doslej ni podatkov o medsebojnem delovanju, zato ni ovire za sočasno jemanje pastil Tantum Verde z drugimi zdravili.

### **Ali pastile Tantum Verde vplivajo na sposobnost za upravljanje vozil in strojev?**

Doslej ni podatkov o zmanjšanju psihofizične sposobnosti za upravljanje vozil in strojev pri uporabi pastil Tantum Verde.

### **Kako odmerjati pastile Tantum Verde?**

Vzemite po eno pastilo 3 do 4 krat na dan. Ravnajte natančno po navodilu, razen če Vam zdravnik svetuje drugače.

### **Kako uporabiti pastile Tantum Verde ?**

Pastilo zadržite v ustih, tako da se povsem razpusti, pomeša s slino ter deluje na sluznico ust in žrela.

### **Kakšni so možni neželeni učinki pastil Tantum Verde?**

*Kot vsa zdravila lahko tudi pastile Tantum Verde povzročijo neželene učinke.*

Neposredno po začetku raztapljanja pastile se pojavi neobčutljivost v ustni votlini in v žrelu. To je posledica lokalnega protibolečinskega delovanja zdravila in preneha že po kratkem času. V izjemno redkih primerih je po uporabi pastil na ustni sluznici zaznati blago pekočo bolečino, slabost, bruhanje ali preobčutljivostne (alergijske) reakcije. Takrat prenehajte jemati zdravilo in navedeni pojavi bodo minili sami po sebi.

*Če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega farmacevta ali zdravnika.*

### **Kako dolgo se lahko zdravite s pastilami Tantum Verde?**

En omot zdravila zadostuje za 5 dni zdravljenja. Če po tem času ni pričakovanega uspeha, obiščite zdravnika.

*Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!*

### **Shranjevanje in rok uporabnosti:**

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Zaščiteno mora biti pred svetlobo, zato ga shranjujte v izvorni zunanji ovojnini.

Zdravila ne smete uporabiti po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini.

*Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.*

**Zadnja revizija navodila:** 10.oktober 2003