



Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas! To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije. Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, morate obiskati zdravnika.



### Kaj je zdravilo Panadol Rapide?

Panadol Rapide so filmsko obložene tablete. 1 filmsko obložena tableta vsebuje 500 mg paracetamola. Zdravilo vsebuje tudi natrijev hidrogenkarbonat, želatiniran škrob, povidon, koruzni škrob, kalijev sorbat (E202), mikrokristalno celulozo, magnezijev stearat, vosek karnaube, titanov dioksid (E171), polidekstrozo, metilhidroksipropilcelulozo, gliceroltriacetat in polietilenglikol.



### Kaj vsebuje pakiranje?

10 ali 20 filmsko obloženih tablet v pretisnem omotu.



### Kako deluje Panadol Rapide?

Tablete Panadol Rapide vsebujejo paracetamol, ki je analgetik (zdravilo proti bolečinam) in antipiretik (zdravilo proti zvišani telesni temperaturi). Posebna formulacija teh tablet omogoča vsaj dvakrat hitrejšo absorpcijo paracetamola v krvni obtok v primerjavi s standardnimi tabletami paracetamola, zato zdravilo hitro učinkuje.



### Kdo je imetnik dovoljenja za prodajo zdravila Panadol Rapide?

GlaxoSmithKline Export Ltd., Podružnica Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, p.p. 4261, 1001 Ljubljana, Slovenija.



### Kdo izdeluje Panadol Rapide?

SmithKline Beecham Ltd, Knockbrack, Dungarvan, Republika Irska, za SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9BD, Velika Britanija



### Za kaj se uporablja Panadol Rapide?

Tablete Panadol Rapide imajo posebno formulacijo, ki hitro in učinkovito odpravlja bolečino pri glavobolu, migreni, zobobolu in nevralgijah, bolečine v hrbtu, revmatske in mišične bolečine ter bolečine ob menstruaciji. Panadol Rapide tudi odpravlja bolečine pri vnetju grla ter znižuje povišano telesno temperaturo in odpravlja bolečine pri prehladu ali gripi.



### Kaj morate vedeti, preden vzamete Panadol Rapide?

**Panadola Rapide ne smete jemati hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.** Panadola Rapide tudi ne smete jemati, če ste alergični na paracetamol ali na katero od drugih sestavin zdravila, ki so naštetje na začetku navodil.

**Pred jemanjem Panadola Rapide se morate posvetovati s svojim zdravnikom:**

- če imate hudo ledvično ali jetrno bolezen;
- če jemljete metoklopramid, domperidon (zdravilo proti slabosti in bruhanju) ali holestiramin (zdravilo za zniževanje ravni holesterola v krvi);
- če jemljete antikoagulantna zdravila (zdravila za redčenje krvi) in potrebujete zdravilo proti bolečinam vsak dan in skozi daljše časovno obdobje. Vendar pa paracetamol občasno lahko vzamete.

**Če ste noseči ali dojite,** se morate pred uporabo tablet Panadol Rapide posvetovati s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

**Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Panadol Rapide**

Vsaka tableta vsebuje 173 mg natrija, zato tega zdravila ne smete jemati, če ste na dieti z malo natrija.



## Kako jemati Panadol Rapide?

### Odrasli, vključno s starejšimi bolniki in otroci, starimi 12 let ali več:

Vzemite po 2 tableti (1000 mg paracetamola) vsake 4 ure oziroma po potrebi. Zdravila ne smete jemati pogosteje kot vsake 4 ure. V 24 urah ne smete vzeti več kot 8 tablet (4000 mg paracetamola). Zdravila ne smete dati otrokom, mlajšim od 12 let.

Če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom.

### Ne prekoračite navedenega odmerka.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, takoj poiščite zdravniško pomoč, tudi če se ne počutite slabo, saj lahko prevelik odmerek paracetamola povzroči jetrno odpoved.



## Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi *Panadol Rapide* neželene učinke. Neželeni učinki paracetamola so redki. Lahko se pojavijo alergične reakcije, npr. kožni izpuščaji. Če opazite kakršnekoli nenavadne učinke, se posvetujte s svojim zdravnikom.



## Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte pri temperaturi do 25°C!

### Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Ne uporabljajte zdravila po preteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii!

### Izdajanje zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

### Datum zadnje revizije besedila

oktober 2001

**Panadol** in **Rapide** sta blagovni znamki skupine podjetij GlaxoSmithKline.

