

COLD3

DALERON

filmsko obložene tablete

Sestava

1 filmsko obložena tableta vsebuje 325 mg paracetamola, 30 mg psevdofedrinijevega klorida in 15 mg dekstrometorfanijevega bromida.
Pomožne snovi: mikrokristalna celuloza, koloidni silikagel, želatiniran škrob, smukec, koruzni škrob, magnezijev stearat, metilhidroksipropilceluloza, titanov dioksid, kinolinsko barvilo (E104), indigooidno barvilo (E132), makrogol.

Kako zdravilo deluje

Filmsko obložene tablete Daleron COLD3 vsebujejo paracetamol (analgetik in antipiretik), psevdofedrinijev klorid (peroralni dekongestiv) in dekstrometorfanijev bromid (antitusik). Zdravilo hkrati blaži več simptomov, ki navadno spremljajo prehladno obolenje.

Paracetamol znižuje povišano telesno temperaturo in blaži bolečino. Deluje tako, da zavira sintezo prostaglandinov v osrednjem živčnem sistemu.

Psevdofedrin ozi razširjene žilice v nosni in žrelni sluznici, tako zmanjšuje pretok krvi in oteklino, s tem pa zmanjšuje izcedek in odpravlja občutek zamašenega nosu.

Dekstrometorfan deluje na center za kašelj tako, da zvišuje prag vzdražnosti za dražljaj kašlja in s tem blaži dražeči kašelj, ki je posledica draženja žrela pri prehladnih obolenjih.

Kdaj zdravilo uporabiti

Daleron COLD3 blaži simptome, ki spremljajo prehladna in gripozna obolenja:

- lajša blage do zmerno bolečine (glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu);
- znižuje povišano telesno temperaturo;
- zmanjšuje izcedek iz nosu in olajša dihanje pri zamašenem nosu;
- pomirja dražeč kašelj.

Kdaj zdravila ne smete uporabiti

Tablet Daleron COLD3 ne smete jemati, če ste preobčutljivi za paracetamol, psevdofedrin, dekstrometorfan ali za druge sestavine zdravila. Zdravila ne smete jemati, če imate hujše motnje v delovanju ledvic in jeter, močno povečan krvni tlak ali hujše obolenje koronarnih arterij (angino pectoris).



Zdravila ne smete jemati, če jemljete predpisana zdravila, ki vsebujejo zaviralce monoaminoooksidaze.

Pred uporabo upoštevajte

Če imate blago do zmerno zmanjšano delovanje ledvic in jeter, smete jemati tablete Daleron COLD3 le pod nadzorom zdravnika.

Zdravilo ni primerno za bolnike s srčnimi obolenji, visokim krvnim tlakom, z boleznimi ščitnice, sladkorno boleznijo ali težavami pri uriniranju zaradi povečane prostate, razen če ga priporoči zdravnik.

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 12 let.

Tablet Daleron COLD3 ne smete jemati hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.

Priporočenih odmerkov ne smete prekoračiti.

Če jemljete tablete Daleron COLD3, ne smete piti alkohola.

Zdravilo smete jemati brez nasveta zdravnika največ 5 dni. Če se stanje ne izboljša ali se celo poslabša, se je treba posvetovati z zdravnikom.

Previdnost pri uporabi je potrebna pri oslabeledih in izčrpanih osebah ter pri alkoholikih.

Nosečnost in dojenje

Varnosti uporabe zdravila med nosečnostjo in dojenjem niso zanesljivo potrili. Jemanja zdravila med nosečnostjo in dojenjem ne priporočamo.

Vpliv na sposobnosti upravljanja vozil in strojev

Zdravilo lahko vpliva na reakcijske sposobnosti, zato je potrebna previdnost pri vožnji in upravljanju s stroji.

Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila

Če sočasno jemljete druga zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravila ne smete jemati sočasno s zdravili, ki vsebujejo zaviralce monoaminoooksidaze (MAO), zdravili za zdravljenje depresije in nekaterih drugih psihičnih ali emocionalnih stanj, ali Parkinsonove bolezni kot tudi ne 2 tedna po končanem zdravljenju z zaviralci MAO. Če niste prepričani, ali vaša predpisana zdravila vsebujejo zaviralce MAO, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Sočasna uporaba lahko povzroči resno hipertenzivno krizo, glavobol in hiperpireksijo ter nevarne srčne aritmije. Opozorite zdravnika, če jemljete zdravila, ki vsebujejo metoklopramid, domperidon, holestiramin ali varfarin. Tablet Daleron COLD3 ne smete jemati sočasno z barbiturati, antiepileptiki, rifampicinom, kloramfenikolom, dihidroergotaminom, metildopom, fluoksetinom ali haloperidolom.

Kako zdravilo odmeriti in ga uporabiti

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, vzamejo 2 tableti največ 4-krat na dan. Presledek med posameznimi odmerki mora biti vsaj 4 ure.





Ukrepanje pri prevelikih odmerkih

Če ste vzeli preveliko količino zdravila, se takoj posvetujte z zdravnikom, tudi če se počutite dobro.

Preveliki odmerki paracetamola lahko zlasti pri bolnikih z ledvičnimi in jetrnimi obolenji povzročijo slabost, bruhanje in hudo jetrno okvaro. Pri prevelikem odmerku psevdoefedrina se lahko pojavijo hud nemir, povečanje krvnega tlaka in srčne aritmije. Preveliki odmerki dekstrometorfana lahko povzročijo slabost, bruhanje, omotičnost, zaspanost, motnje vida, otopelost, neuskkljenost gibov in oteženo dihanje.

Stranski učinki

Ob jemanju priporočenih odmerkov so stranski učinki redki in blagi. Občasno se lahko pojavijo slabost, suha usta, razdražljivost, nemir, redko povečanje krvnega tlaka. Če se pojavijo stranski učinki, zdravilo prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Shranjevanje in uporabnost

Zdravila ne smete uporabljati po poteku roka uporabnosti, navedenem na ovojnicini.

Shranjujte zaščiten pred vlago in svetlobo pri temperaturi do 30° C.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Izdajanje zdravila

Zdravilo izdajamo brez zdravniškega recepta.

Oprema

Zloženska z 12 filmsko obloženimi tabletami v pretisnem omotu.
Zloženska s 24 filmsko obloženimi tabletami v pretisnem omotu.

Datum zadnje revizije navodila 11.07.2000

Ime in naslov proizvajalca

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, Slovenija

