

## **DEHINEL® PLUS tablete**

### **Kakovostna in količinska navedba zdravilnih učinkovin**

1 tableta vsebuje:

Febantel (febantel)	150 mg
Pyrantel Embonate (pirantelijev embonat)	144 mg
Praziquantel (prazikvantel)	50 mg

### **Delovanje**

Dehinel plus je širokospektralni kombinirani antihelmintik, ki učinkovito odpravlja notranje zajedavce pri psih. Zdravilo vsebuje tri učinkovine z različnim načinom delovanja na zajedavce.

Febantel se v jetrih pretvori v številne metabolite, ki v občutljivih zajedavcih motijo delovanje mikrotubulov, sočasno pa zavirajo aktivnost fumarat reduktaze, ki je ključni encim v njihovem energetskem metabolizmu. Prekinejo tudi transport in resorpcijo glukoze.

Pirantelijev embonat v zajedavcih zavira nevromuskularni prenos dražljajev in povzroči spastično paralizo njihovega mišičja. Gostitelj izloči zajedavce iz prebavil s peristaltiko.

Prazikvantel se po adsorpciji iz prebavil razgradi v jetrih in izloči z žolčem. Poškoduje ovojnico trakulj in povzroči spastično paralizo mišičja zajedavcev. Občutljive trakulje se v prebavilih razgradijo, zato v iztrebkih redko najdemo cele zajedavce, njihove skolekse ali odrivke.

### **Vrste živali, katerim je zdravilo namenjeno**

Psi.

### **Indikacije**

Zdravljenje mešanih invazij z askaridi, nematodi in cestodi pri psih:

Askaridi: *Toxocara canis* (odrasle in razvojne oblike)  
*Toxascaris leonina* (odrasle in razvojne oblike)

Nematodi: *Uncinaria stenocephala* (odrasle in razvojne oblike)  
*Ancylostoma caninum* (odrasle in razvojne oblike)  
*Trichuris vulpis* (odrasle oblike)

Cestodi: *Echinococcus granulosus*  
*Echinococcus multilocularis*  
*Dipylidium caninum*  
*Taenia* spp.  
*Multiceps multiceps*  
*Mesocestoides* spp.

### **Kontraindikacije**

Breje psice ne zdravimo v prvih dveh tretjinah brejosti.

### **Stranski učinki**

Niso znani.

**Odmerki in način dajanja zdravila**

Priporočeni odmerek na kg telesne mase je 15 mg febantela, 14,4 mg pirantelijevoga embonata in 5 mg prazikvantela, kar pomeni 1 tableto na 10 kg telesne mase živali.

Tablete odmerimo glede na telesno maso živali po naslednji shemi:

Mladiči in majhni psi: do 5 kg telesne mase – ½ tablete  
do 10 kg telesne mase – 1 tableta

Srednje veliki psi: do 15 kg telesne mase – 1 in ½ tablete  
do 20 kg telesne mase – 2 tableti  
do 30 kg telesne mase – 3 tablete

Veliki psi: do 40 kg telesne mase – 4 tablete  
do 50 kg telesne mase – 5 tablet  
do 60 kg telesne mase – 6 tablet

Tablete damo živalim na koren jezika ali jih skrijemo v košček mesa, klobase ali sira. Zadostuje enkratni odmerek zdravila.

Za učinkovito preprečevanje parazitov priporočamo dajanje 3 do 4-krat na leto.

Pri diagnosticirani parazitozi žival takoj dehelmintiziramo. V primeru težje invadiranosti lahko dajanje ponovimo po dveh tednih.

**Interakcija z drugimi zdravili in druge oblike interakcij**

Zdravila ne smemo dajati skupaj z drugimi holinergiki (npr. levamizolom) in učinkovinami, ki delujejo na acetilholinesterazo (npr. organofosforne spojine). Ne smemo ga tudi dajati sočasno z zdravili, ki vsebujejo piperazin, ker v občutljivih zajedavcih povzročajo nevro-muskularno paralizo.

**Posebna opozorila za živalsko vrsto**

Mladičem in odraslim živalim pred zdravljenjem ni treba dajati dietne hrane. Mladiči se ne invadirajo s trakuljami pred tretjim tednom starosti. Če s parazitološko preiskavo blata ugotovimo mešano invazijo, živali zdravimo po tretjem tednu starosti. Pri invaziji mladičev z askaridi priporočamo ponovno zdravljenje pri starosti 6 in 12 tednov. Blato zdravljenih živali neškodljivo odstranimo tako, da iztrebke pobereemo v vrečko in odvržemo v smetnjak.

**Karenca**

Ni smiselna.

**Način izdaje zdravila**

Brez veterinarskega recepta.

**Posebni varnostni ukrepi pri odstranjevanju neporabljenega zdravila oziroma odpadnega materiala**

Z neporabljenim zdravilom ravnamo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Klasifikacijska številka s seznama odpadkov (oznaka odpadka): 20 01 18 (zdravila).

**Pogoji shranjevanja**

Zdravilo hranimo v originalni ovojnini pri temperaturi do 25 °C, nedosegljivo otrokom.

**Posebni varnostni ukrepi pri skladiščenju**

Jih ni.

**Rok uporabnosti**

Označen je na ovojnini (2 leti).

**Številka dovoljenja za promet**

323-0308/2002/83

**Oprema**

Zloženska z dvojnimi trakom po 2, 4, 6, 10, 20 in 100 tablet.

**Ime in naslov proizvajalca in imetnika dovoljenja za promet**

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenija

**Datum zadnje revizije navodila**

29.1.2004

---