

**Hranjive vrijednosti/  
Povprečna hranilna vrednost**

	Na 100g praha/ prahu	Na 100ml pripremljenog ročica / priprav- ljivega obroka
Energija/ Energijska vrednost	kJ 2105	280 67
Masti, od kojih/ Maščobe, od tega:	g 25,5	3,4 3,4
- zasićene masne kiseline/ nasitene maščobne kiseline	g 2,4	0,3 0,3
- jednodruko nezasićene masne kiseline/ enkrat nenasićene maščobne kiseline	g 16,0	2,1 2,1
- višedruko nezasićene masne kiseline/ većkrat nenasićene maščobne kiseline	g 4,7	0,6 0,6
α-limolenska kiselina/kislina (D3)	mg 320	43 43
Dokozahexaenska kiselina/DHA (D3)/ dokozahexaenska kiselina, DHK (D3)	mg 1400	19 19
Linolna kiselina/kislina (D6)	mg 400	533 533
Arahidonska kiselina/kislina (ARA), Ogljikovi hidrati, od tega:	mg 140	19 19
- šećeri/sladkorji	g 56,7	7,6 7,6
- laktoza	g 0,8	1,1 1,1
Vlakna/Vlaknine	g < 0,050	< 0,0067 < 0,0067
Bjelančevine/ Beljakovine	g 11,7	1,6 1,6
Kalcij	mg 317	42 42
Fosfor	mg 180	24 24
Kalij	mg 620	83 83
Natrij	mg 180	24 24
Kloridi/ Klorid	mg 405	54 54
Željezo/ Železo	mg 5,2	0,69 0,69
Cink	mg 3,4	0,46 0,46
Jod	µg 100	13 13
Selen	µg 25	3,3 3,3
Bakar/ Baker	mg 0,4	0,5 0,5
Magnezij	mg 42	5,6 5,6
Mangan	mg 0,14	0,02 0,02
Fluor	µg ≤ 60	≤ 8,0 ≤ 8,0
Vitamin A	µg 400	53 53
Vitamin D	µg 11	1,5 1,5
Vitamin E	mg 16	2,1 2,1
Vitamin K	µg 45	6,0 6,0
Vitamin C	µg 90	12 12
Tiamin	mg 0,48	0,06 0,06
Riboflavin	mg 0,50	0,07 0,07
Niacin	mg 3,7	0,49 0,49
Vitamin B6	mg 0,24	0,03 0,03
Folat	µg DFE 170	23 23
Vitamin B12	µg 1,6	0,21 0,21
Pantotenska kiselina/kislina	mg 2,4	0,32 0,32
Biotin	µg 10	1,3 1,3
Holin	mg 170	23 23
Inozitol	mg 39	5,2 5,2
Taurin/ Taurin	mg 34	4,5 4,5
Karnitin	mg 9	1,2 1,2
Nukleotidi	mg 17	2,3 2,3

D12470657HRSLOA

NLNBW038-2

**HR** **Sastojci:** glukozni sirup, biljna ulja (suncokretovo ulje bogato oleinskom kiselinom, repičino ulje s niskim sadržajem eruka kiseline, suncokretovo), bjelanjčevine **sirutke**, **mlijecna** bjelanjčevina, minerali (kalijev klorid, kalcijev citrat, natrijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, kalijev citrat, željezov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), emulgator: **soja** lecitin, **riblje** ulje, ulje iz *Mortierella alpina*, kolin bitartarat, amino kiseline (L-fenilalanin, L-histidin, L-tryptofan), regulator kiselosti: limunska kiselina, vitamin (vitamin C (natrijev L-askorbat), vitamin E (D, L α-tokoferil acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotemat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folat (folna kiselina), vitamin K (filokoban), vitamin D (kolekalciferol), D-biotin, vitamin B12 (cijanokobalamin)), *Limosilactobacillus reuteri* kultura, taurin, nukleotidi [citidin 5'-monofosforna kiselina (CMP), uridin 5'-fosforna kiselina (UMP), adenozin 5'-fosforna kiselina (AMP)], guanozin 5'-fosforna kiselina (GMP)], inozitol, L-karnitin.

**SLD** **Sestavine:** glukozni sirup, rastlinska ulja (suncokretovo ulje, bogato z oleinsku kiselinu, ogrščično, suncokretovo), bjelanjčevine **sirutke**, izolat **mlečnih** bjeljakovina, minerali (kalijev klorid, kalcijev citrat, natrijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, kalijev citrat, željezov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), emulgator: **sojin** lecitin; **ribje** ulje, ulje iz gljive *Mortierella alpina*, holin bitartarat, aminokiseline (L-fenilalanin, L-histidin, L-tryptofan), sredstvo za uravnavanje kiselosti: citronska kiselina; vitamin (vitamin C (natrijev L-askorbat), vitamin E (D, L α-tokoferil acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotemat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folna kiselina, vitamin K (filokoban), vitamin D (holekalciferol), D-biotin, vitamin B12 (cijanokobalamin)), kultura *Limosilactobacillus reuteri*<sup>†</sup>, taurin, nukleotidi [citidin 5'-monofosforna kiselina (CMP), uridin 5'-fosforna kiselina (UMP), adenozin 5'-fosforna kiselina (AMP)], guanozin 5'-fosforna kiselina (GMP)], inozitol, L-karnitin. <sup>†</sup>Kultura *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 po licenci BioGaia AB.

Veličina mjerice: 4,4 g praha + 100 ml obroka = 13,32 g praha + 90 ml vode + Pakiranje sadrži 13-30 porcija (videti tablicu hranjenja).  
Pakirano u kontroliranoj atmosferi. • Neoptovno čuvati na suhom i hladnom mjestu. • Koristite do 3 tjedna nakon otvaranja. • **Najbolje upotrijebiti do kraja:** označeno na dnu limenke.

Velikost merice: 4,4 g prahu + 100 ml pripravljene obroke = 13,3g prahu (3 merice) + 90 ml vode + Pakiranje vsebuje 13 -30 obrokov (odvisno od starosti otroka - glejte preglednico hranjenja). Pakirano v kontrolirani atmosferi. • **Uporabno najmanj do konca:** glejte oznako odtsinjeno na dnu embalaže. • Shranjujete na suhem in hladnem mestu. • **Odprt izdelek je uporaben 3 tedne.**

**NAN<sup>®</sup> OPTIPRO<sup>®</sup> BEZ/ BREZ LAKTOZE**

**HR** **Počtena mlijecna hrana za dojenčad. Od rođenja.**  
**SLD** **Začetno mleko za dojenčade. Od rojstva dalje.**

**HR** **NAN<sup>®</sup> Bez laktoze, nije indiciran za dojenčad s galaktosemijom. NAN<sup>®</sup> Bez laktoze** je dojenčaki mlijecni pripravak, koji se može koristiti od rođenja nadalje, kada se dijete ne može dojiti.

**SLD** **NAN<sup>®</sup> bez laktoze ni primeren za dojenčad z galaktosemijom. NAN<sup>®</sup> brez laktoze** je mlečni pripravak za dojenčake, ki se lahko uporablja od rojstva, kadar dojenje ni mogoče.

**HR** Naši stručnjaci su razvili jedinstvenu recepturu **NAN<sup>®</sup> Bez laktoze;**

Sadržava **DHA-u**, kako je propisano zakonodavstvom za svu početnu hranu za dojenčad. (Delegirana Uredba 2016/127).  
Upitajte svog liječnika za više informacija početnom mlijeku za dojenčad **NAN<sup>®</sup> Bez laktoze.**

**SLD** Vsebuje dokozahexaensko kisolino (kot zahteva zakonodaja za vse začetne formule za dojenčake).  
Vprašajte svojega zdravnika za več informacij o začetnem mleku za dojenčake **NAN<sup>®</sup> brez laktoze.**

Bezpлатni info broj: 0800 600 604, info@hr.nestle.com, www.nestle.hr, www.nestlebaby@me.hr, FB Nestlé Baby&me Hrvatska/ Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505, info@si.nestle.com  
**Proizvođač/ Proizvajalec:** Nestlé Nutrition Nevođevac, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nizozemska. • **Stavlja na tržište:** Nestlé Adriatic d.o.o., Aveanja V. Holjeva 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska. • **Distributer u Sloveniji:** INSPHARMA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.



**e 400g**



**HR VAŽNA NAPOMENA:** majčino mlijeko je najbolja hrana za dojenče. Prije nego odlučite koristiti početnu mlijecnu hranu, posavjetujte se sa svojim zdravstvenim djelatnikom. Proizvod je primjeren za prehranbene potrebe dojenčadi od rođenja ako se ne doje ili nisu dovoljno dojena. **SLD POMEMBNO OBVESTILO:** Materino mlijeko je najbolja hrana za dojenčake. Pred uporabo tega izdelka se posavjetujte z zdravnikom, farmaceutom ali drugim strokovnjakom s področja nege matere in otroka. Izdelek je primjeren za posebne prehranbene namene za dojenčake od rojstva, kadar jih matere ne dojijo ali ne dojijo dovolj.

**PRIPREMA/ NAVODILO ZA PRIPRavo OBROKA 1.** Operite ruke prije pripreme obroka./ Pred pripravo obroka si skrbno umijte ruke. **2.** Operite bočicu, dudu i poklopac dok ne uklonite i posljednje ostatke mlijeka. Prokuhajte sav pribor za hranjenje. / Skrbno operite stekleničku, pokrovec in dudu, tako da odstranite vse ostatke mleka. Nato vs pribor se prokuhajte. **3.** Prokuhajte pitku vodu 5 minuta. Ohladite (~40°C). / Prekuhajte vodo vsaj 5 minut in jo nato shladite na ~40 °C. **4.** Slijedite tablicu hranjenja, stavite tucno količino tople vode in prokuhanu bočicu. Zatim dodajte točan broj mjerica prema uputama iz tablice hranjenja. Koristite isključivo priloženo mjericu. / Vlijete zahtevano količino ohlajene vode in prokuhanu stekleničko. Tako dodajte tucno določeno število meric prahu ledke na starost dojenčaka. Za količine glejte preglednico hranjenja. Uporabljajte izključno priloženo meroico. **5.** Ošugurajte da mjerica bude suha, pa je vratite u limenku./ Po uporabi meroico dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posodi. **6.** Zatvorite bočico i dobro je protresite dok se prah potpuno ne otopi. **7.** Provjerite temperaturu obroka prije nego počnete hraniti dijete. / Zaprite stekleničko in nato stresajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.

**TABLICA HRANJENJA/ PREGLEDNICA HRANJENJA**

Dob dojenčeta/ Starost dojenčaka	Količina po obroku/ Količina za en obrok		Broj obroka na dan/ Število obrokov dnevno		
	Prethodno prokuhana voda u ml* / Prekuhana voda v ml*	Broj mjerica** / Število meric**	NAN BEZ/BREZ LAKTOZE	Ostalo	
1. i 2. tjedan/ 1. in 2. teden	90	3	6	-	
3. i 4. tjedan/ 3. in 4. teden	120	4	5	-	
2. mjesec/ 2. mesec	150	5	5	-	
3. i 4. mjesec/ 3. in 4. mesec	180	6	5	-	
5. i 6. mjesec/ 5. in 6. mesec	210	7	5	-	
Od 7. do 9 mjeseca/ mesec	210	7	4-3	1-2***	
Od 10. mjeseca/ meseca napre	210	7	3-2	2-3***	

**HR** \*Prokuhana voda mora se ohladiti do tjelesne temperature prije dodatka praha kako bi broj živih bakterija ostao isti.  
**\*\*Napomena:** Uporaba više ili manje praha od naznačenog će dovesti do dehidracije dojenčaka ili čete mu uskratiti pravilnu prehranu. Ne mijenjajte naznačene količine bez liječničkog savjeta. \*\*\*U ovoj se dobi preporučuje postepeno uvođenje žitarica u prehranu djeteta, kao i druge hrane (povrće, voće, meso, riba). Prije uvođenja nove prehrane u prehranu svog djeteta potražite savjet svog liječnika. Ako vaš liječnik preporučuje uvođenje nove hrane ranije, u skladu s tim smanjite količinu mlijeka kao što preporučuje. **SLD** \* Pred dodatkom dojenčaka je potrebno prokuhano vodu ohladiti na ~ 40 °C, zato da se ohrani število živih bakterija *Limosilactobacillus reuteri*. **\*\* Opomba:** Uporabljajte izključno priloženo meroico. Uporaba većje ali manjše količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom. **\*\*\*Pri tej starosti se priporoča postopno uvajanje mesane hrane (zelenjava, meso, žitarice, sadje in ribe). Ser se potrebe pri posemiznem dojenčku razlikujejo, se o tem posavjetujte z zdravnikom. Če zdravnik priporoči zgodnejše uvajanje druge hrane, skladno s priporočilom zmanjšajte količino mleka.**

**HR** **Upozorenje:** zbog neprokuhane vode, neprokuhane bočice ili nepravilnog razrjeđivanja hrane, Vaše dojenče se može razboljeti. Nepropravno skladištenje, rukovanje, pripremanje i hranjenje potencijalno može dovesti do nepovoljnih učinaka na zdravlje dojenčeta. Pripremite svaki put samo jednu bočicu. Hranite odmah i točno slijedite upute. Ne čuvajte ostatke obroka. Uvijek držite dojenčad dok ga hranite. Ostane li dojenčad bez nadzora može se zacrnuti.  
**SLD** **OPPOZORILO:** Zaradi neprokuhane vode, neprokuhane stekleničke ali nepravilnega ređčenja lahko vaš otrok zbolí. Nepravilno shranjevanje, rokovanje, priprava in hranjenje dojenčaka lahko vodijo do neželjenih učinkov na zdravlje dojenčaka. Vsakí pripravite svež obrok v steklenički in takó nahranite dojenčaka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite. Med hranjenjem dojenčaka držite in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčaka pustite brez nadzora, lahko pride do zažutitve.