

## Navodilo za uporabo

### Claritine S 10 mg tablete

loratadin

#### **Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 10 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Claritine S in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Claritine S
3. Kako jemati zdravilo Claritine S
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Claritine S
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Claritine S in za kaj ga uporabljamo**

Ime vašega zdravila je Claritine S tablete.

##### **Kaj je zdravilo Claritine S**

Zdravilo Claritine S tablete vsebuje učinkovino loratadin, ki spada v skupino zdravil imenovanih "antihistaminiki".

##### **Kako deluje zdravilo Claritine S**

Zdravilo Claritine S lajša simptome alergije s tem, ko zavre delovanje histamina, snovi, ki nastaja v telesu, če ste na nekaj alergični.

##### **Kdaj vzeti zdravilo Claritine S**

Zdravilo Claritine S lajša simptome, povezane z alergijskim rinitisom (na primer senenim nahodom), kot so kihanje, izcedek iz nosu ali srbenje nosu in pekoč občutek v očeh ali srbenje oči.

Zdravilo Claritine S se lahko uporablja tudi za pomoč pri lajšanju simptomov koprivnice (srbenja, rdečice, števila in velikosti izpuščajev).

Učinek zdravila Claritine S traja ves dan, kar vam bo pomagalo, da boste lahko nadaljevali z običajnimi vsakodnevnimi aktivnostmi (vključno s spanjem).

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 10 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Claritine S**

##### **Ne jemljite zdravila Claritine S**

- če ste alergični na loratadin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

##### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom jemanja zdravila Claritine S se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate bolezen jeter,
- če ste naročeni na kožne teste za ugotavljanje alergij. Zdravila Claritine S ne jemljite dva dneva pred testiranjem, ker lahko to zdravilo vpliva na rezultate preiskav.

Če kar koli od naštetega velja za vas (ali če ste negotovi), se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Claritine S.

### **Otroci**

Otrokom, mlajšim od 6 let ali otrokom, ki tehtajo 30 kg ali manj, ne dajajte zdravila Claritine S tablete. Na voljo je druga oblika tega zdravila (sirup), ki je bolj primerna za otroke, mlajše od 6 let, ki tehtajo 30 kg ali manj.

Otroci, mlajši od 2 let:

Varnost in učinkovitost zdravila Claritine S še nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

### **Druga zdravila in zdravilo Claritine S**

Neželeni učinki zdravila Claritine S se lahko povečajo, kadar se jemlje skupaj z zdravili, ki spremenijo delovanje nekaterih encimov, ki so odgovorni za presnovo zdravil v jetrih. Kljub temu v kliničnih študijah niso poročali o povečanju neželenih učinkov loratadina ob hkratni uporabi s pripravki, ki spremenijo delovanje teh encimov.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

### **Zdravilo Claritine S skupaj s hrano, pijačo in alkoholom**

Tableto lahko vzamete neodvisno od obroka. Ni bilo dokazano, da bi zdravilo Claritine S povečalo učinek alkoholnih pijač.

### **Nosečnost in dojenje**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Iz previdnostnih razlogov se je uporabi zdravila Claritine S med nosečnostjo bolje izogibati.

Če dojite, ne jemljite zdravila Claritine S. Loratadin se izloča v materino mleko.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

V kliničnih preskušanjih za oceno sposobnosti vožnje pri bolnikih, ki so prejeli loratadin, ni prišlo do poslabšanja te sposobnosti. Ni pričakovati, da bi zdravilo Claritine S v priporočenem odmerku povzročalo zaspanost ali zmanjšalo zbranost bolnika. Kljub temu pa zelo redko nekateri ljudje postanejo zaspani, kar lahko vpliva na njihovo sposobnost za vožnjo ali upravljanje strojev.

### **Zdravilo Claritine S vsebuje laktozo**

Zdravilo Claritine S vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

## **3. Kako jemati zdravilo Claritine S**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Razdelilna zarez je namenjena le delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na enaka odmerka.

### **Koliko zdravila vzeti:**

#### **Odrasli in otroci, stari 6 let in več, s telesno maso nad 30 kg:**

Vzemite eno tableto enkrat na dan, s kozarcem vode, s hrano ali brez nje.

**Telesna masa 30 kg ali manj:**

Ne dajajte zdravila Claritine S. Na voljo je druga oblika tega zdravila (sirup), ki je bolj primerna za otroke mlajše od 6 let ali otroke, ki tehtajo 30 kg ali manj.

**Otroci, mlajši od 2 let:**

Zdravila Claritine S se ne sme uporabljati pri otrocih, mlajših od 2 let.

Samozdravljenje z zdravilom Claritine S je primerno za odrasle in mladostnike, stare več kot 12 let.

Zdravljenje pri mladostnikih naj nadzorujejo starši.

Zdravljenje pri otrocih, starih 2 do 12 let, ki tehtajo več kot 30 kg, naj poteka pod nadzorom zdravnika.

**Odrasli in otroci s hudo okvaro jeter:**Odrasli in otroci, ki tehtajo več kot 30 kg:

Vzemite eno tableto vsak drugi dan, s kozarcem vode, s hrano ali brez nje. Pred začetkom jemanja tega zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

**Če ste vzeli večji odmerek zdravila Claritine S, kot bi smeli**

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Claritine S, kot bi smeli, se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri prevelikem odmerjanju ni pričakovati resnejših težav, lahko pa se pojavi glavobol, hitro utripanje srca ali zaspanost.

**Če ste pozabili vzeti zdravilo Claritine S**

- Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila, ga vzemite takoj, ko se spomnite, potem pa nadaljujte z običajnim jemanjem.
- Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

**4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Najpogosteje poročani neželeni učinki pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let, so:

- zaspanost
- glavobol
- povečan apetit
- težave s spanjem.

Najpogosteje poročani neželeni učinki pri otrocih, starih od 2 do 12 let, so:

- glavobol
- živčnost
- utrujenost.

V obdobju trženja loratadina so poročali tudi o naslednjih **zelo redkih** neželenih učinkih (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- huda alergijska reakcija (vključno z otekanjem)
- omotica
- krči
- pospešen srčni utrip
- neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca
- siljenje na bruhanje
- suha usta
- razdražen želodec

- težave z jetri
- izpadanje las
- izpuščaj
- utrujenost.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- povečana telesna masa.

### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke Sektor za farmakovigilanco Nacionalni center za farmakovigilanco Slovenčeva ulica 22 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 (0)8 2000 500 Faks: +386 (0)8 2000 510 e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si spletna stran: www.jazmp.si S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## **5. Shranjevanje zdravila Claritine S**

- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Shranjujte pri temperaturi do 25 °C! Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.
- Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.
- Ne uporabljajte zdravila Claritine S, če opazite kakršne koli spremembe v videzu tablet.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

### **Kaj vsebuje zdravilo Claritine S**

- Učinkovina je loratadin. Ena tableta vsebuje 10 mg loratadina.
- Druge sestavine zdravila so laktoza monohidrat, koruzni škrob, magnezijev stearat.

### **Izgled zdravila Claritine S in vsebina pakiranja**

tableta

Bele do skoraj bele, ovalne tablete z zarezo na eni strani in brez oznak na drugi strani. Razdelilna zareza je namenjena le delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na enaka odmerka. Škatla z 10 tabletami v Alu-PVC - pretisnem omotu.

### **Način in režim izdaje zdravila Claritine S**

BRp – Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:  
Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Proizvajalec:  
Bayer Bitterfeld GmbH  
Ortsteil Greppin  
Salegaster Chausse 1  
06803 Bitterfeld-Wolfen  
Nemčija

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 4. 5. 2021.**