

## NAVODILO ZA UPORABO

### PRAZINON PLUS tablete za pse

#### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d. d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška

#### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI PRAZINON PLUS tablete za pse

#### 3. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN

1 tableta vsebuje:

Prazikvantel	50,0 mg
Pirantelijeve embonat	144,0 mg
Febantel	150,0 mg

#### 4. INDIKACIJE

Odpravljanje zajedavskih invazij z nematodi (valjastimi črvi) in cestodi (trakuljami) pri odraslih psih in pasjih mladičih:

- nematodi: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*;

- cestodi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Taenia serialis*, *Taenia ovis*, *Taenia cervi*, *Mesocestoides* spp. in *Joyeuxiella* spp.

#### 5. KONTRAINDIKACIJE

Tablet ne dajemo sočasno s pripravki, ki vsebujejo piperazin.

Tablet PRAZINON PLUS ne dajemo psicam v prvih 40 dneh brejosti.

#### 6. NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite neželene učinke tega zdravila, takoj obvestite pristojni organ za farmakovigilanco in imetnika dovoljenja za promet.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

#### 7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi.

#### 8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Tablete dajemo same ali dodane v primerno hrano (košček mesa, sira ipd.). Priporočamo dajanje tablet pred obrokom hrane, živali pa pred in po zdravljenju ni treba postiti.

Odmerki:

Ena tableta na 10 kg telesne mase enkratno (to je 5 mg prazikvantela, 15 mg febantela in 14,4 mg

pirantelijevega embonata na kg telesne mase).

Za redno dehelmintizacijo priporočamo dajanje tablet vsake tri mesece. Pri hujših invazijah ponovimo zdravljenje po 14 dneh.

*Pasji mladiči in majhni psi*

0,5 do 2 kg telesne mase	1/4 tablete
2 do 5 kg telesne mase	1/2 tablete
5 do 10 kg telesne mase	1 tableta

*Srednje veliki psi*

10 do 20 kg telesne mase 2 tableti

20 do 30 kg telesne mase 3 tablete

*Veliki psi*

30 do 40 kg telesne mase 4 tablete

Pri pasjih mladičih je invadiranost s trakuljami možna šele, ko dopolnijo tri tedne starosti, nato jim lahko dajemo PRAZINON PLUS, če ugotovimo mešano invazijo z valjastimi črvi in trakuljami.

Priporočamo redno dehelmintizacijo psov pred cepljenjem.

#### 9. NASVET O PRAVLNI UPORABI ZDRAVILA

Glejte poglavje 8.

#### 10. KARENCA

Ni smiselno.

#### 11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (2 leti).

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

#### 12. POSEBNA OPOZORILA

Pripravke s pirantelom je treba uporabljati previdno pri zelo kahektičnih živalih. Ker prazikvantel ne deluje ovicidno, je treba iztrebke zdravljenih živali neškodljivo odstraniti (zakopati, zažgati).

Ker so bolhe vmesni gostitelji za trakuljo *D. caninum*, je treba sočasno z dehelmintizacijo uničevati tudi njih. Ne smemo prekoračiti priporočenega odmerka, zlasti ne pri zdravljenju brejih psic.

#### 13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

#### 14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODILA ZA UPORABO

12.3.2014

#### 15. DRUGE INFORMACIJE

##### Delovanje

Tableta vsebuje tri učinkovine, kar omogoča širok spekter antihelmintičnega delovanja. Posamezne sestavine v tableti medsebojno ne interferirajo, temveč delujejo samostojno.

Prazikvantel deluje cestocidno proti zrelim in nezrelim stadijem trakulj (cestodi). Po peroralnem vnosu se hitro in skoraj popolnoma resorbira iz črevesja, metabolizira v jetrih in izloča z urinom. Cestocidno delovanje temelji na prazikvantelovi lastnosti, da depolarizira kutikulo pri trakuljah in povzroča spastično paralizo njihovega mišičja. Deluje na parazite v sluznici duodenuma in na juvenilne oblike ehinokokov, skritih v Liberkinijevih kriptah. Nekaj sekund po interakciji prazikvantela s fosfolipidi in proteini trakulj se okvari njihova kutikula, v zajedavčeve celice vstopajo ioni Ca<sup>2+</sup>, vsa strobila pa se skrči. Trakulje poginejo po dehelmintizaciji in gostitelj jih prebavi. To je razlog, da v iztrebkih redko najdemo cele trakulje, skolekse ali dele členkov.

Pirantelijeve embonat je širokospektralni antihelmintik, ki učinkuje proti velikemu številu valjastih črvov (nematodov). Zavira živčnomišični prenos dražljajev in povzroča spastično paralizo njihovega mišičja.

Peristaltika gostiteljevega črevesja izloča poginjene zajedavce.

Febantel je širokospektralni probenzimidazol, ki učinkuje na številne nematode. Njegova najpomembnejša metabolita fenbendazol in oksfendazol se v enterocitih in kutikuli parazitov vežeta za strukturni protein tubulin in zavirata polimerizacijo mikrotubulov, nujnih za transportni sistem resorptivnih celic, kar povzroči avtolizo nematod. Ugodno je, ker pirantel in febantel delujeta sinergistično.

##### Način izdaje zdravila

Brez recepta.

##### Oprema

Škatla z 2-krat 10 tabletami

Škatla z 10-krat 10 tabletami