



**Pred uporabo Dimexanol šumečih tablet natančno preberite navodila in jih skrbno shranite, saj vsebujejo pomembne informacije. Če potrebujete več informacij, nasvet ali če se po uporabi izdelka pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.**

## 1. Komu je Dimexanol namenjen?

Dimexanol je namenjen osebam, ki trpijo zaradi akutne in kronične driske. Driska je pogosta in neprijetna prebavna motnja, ki jo lahko spremljajo trebušni krči in občutek slabosti. Driska lahko povzroči dehidracijo in oslabi telo.

## 2. Čemu je Dimexanol namenjen?

Dimexanol zaustavi akutno in kronično drisko. Zahvaljujoč Morilyte™, nase veže snovi, ki povzročajo drisko, in tako zaustavi njihovo delovanje, hkrati pa pomaga pri rehidraciji in tako omogoča hitro okrevanje.

## 3. Kaj vsebuje Dimexanol?

Dimexanol vsebuje Morilyte™, ki je sestavljen iz užitne naravne gline (diosmektit) z dodanimi elektroliti. Skupaj tvorijo zaščitno plast na črevesni sluznici – le-ta veže snovi, ki povzročajo drisko in prepreči nadaljnje širjenje okužbe. Aktivna sestavina obenem podpira rehidracijo s sproščanjem elektrolitov in s tem nadomešča izgubljeno vodo in soli. Tablete vsebujejo tudi dekstrozo, citronsko kislino, kalcijev karbonat, natrijev klorid, kalcijev bikarbonat, natrijev hidrogenkarbonat, aromo pomaranče in grenivke, aspartam in kalijev acesulfam.

## 4. Navodila za uporabo:

- Šumečo tableto raztopite v 1/2 kozarca vode (125 ml) in popijte.
- Proizvod je namenjen odraslim in otrokom od 5. leta starosti.
- Za odrasle in otroke, starejše od 12 let: vzemite 1 tableto, 3-krat na dan.
- Za otroke od 5. do 12. leta starosti: vzemite 1 tableto, 2 do 3-krat na dan.
- O uporabi pri otrocih mlajših od 5 let se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če pozabite vzeti priporočeni odmerek, ga ne podvajajte, temveč normalno nadaljujte z jemanjem.
- Če simptomi po 3 dneh ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

Proizvod ne izključuje zdravljenja za nadomestitev izgubljene vode in elektrolitov v kolikor je to potrebno. To je posebej pomembno za otroke in starejše osebe.

## 5. Previdnostni ukrepi:

- Ne uporabljajte Dimexanol tablet, če ste na dieti brez soli, če imate fenilketonurijo ali težave z ledvicami.
- Ne uporabljajte izdelka, če ste alergični na katero od sestavin.
- Če jemljete ali ste pred kratkim jemali druga zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravila je priporočljivo zaužiti vsaj 2 uri pred ali po jemanju Dimexanola.
- Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Ne prekoračite priporočenega odmerka.
- Prevelik odmerek lahko povzroči zaprtje. V tem primeru prenehajte z jemanjem tablet. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.
- Če se po zaužitju izdelka pojavijo kakršnekoli alergijske reakcije ali neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- V primeru kakršnegakoli zdravstvenega stanja se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## 6. Shranjevanje:

- Shranjevati izven dosega in pogleda otrok.

- Vsebnik hranite tesno zaprt na suhem in hladnem prostoru pri temperaturi do največ 25 °C.
- Napitek zaužijte takoj, ko se tableta raztopi. Morebitni preostanek napitka po 1 uri zavrzite.
- Ne uporabljati po izteku roka uporabe, navedenega na embalaži in vsebniku.

Dimexanol je izdelek blagovne znamke **Benegast**. **Benegast** nudi izdelke za ponovno vzpostavitev in ohranjanje zdravja prebavil.

ZGAGA IN PREBAVNE MOTNJE

**Benegast Reduflux tablete** (20 žvečljivih tablet) in **Reduflux vrečke s tekočino** (15 vrečk); takojšnje delovanje in dolgotrajno olajšanje od zgage ter prebavnih motenj.

DRISKA

**Benegast Dimexanol** (10 šumečih tablet): Zaustavi drisko in podpira rehidracijo.

Za več informacij o izdelkih **Benegast** obiščite spletno stran [www.benegast.com](http://www.benegast.com).

**benegast**

## Proizvajalec:

InPharm Europe Ltd., Waldseeweg 6, 13467 Berlin, Nemčija  
**Distributer:** Adriatic BST d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana

Dimexanol je registriran kot medicinski pripomoček. Njegova varnost in učinkovitost sta bili ocenjeni v skladu z evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS.

Datum zadnje revizije:  
 December 2014

 **OMEGA  
 PHARMA**

  
 0197