



(S) ORAFLIGO® JUNIOR gel

Afje vse poškodbe ustne sluznice so zelo pogoste pri otrocih in najstnikih. Poročajo bolečino in ugodje. Uživanje hrane in pijače še dodatno poslabša stanje v ustih.

ORAFLIGO® JUNIOR je nov gel s sestavini za otroke za vse rane v ustih ali za vzdrževanje poškodovana ustna tkiva.

ORAFLIGO® JUNIOR gel lajša bolečino, tvori zaščitno plasti in prizadetim tkivom omogoča naravno celjenje. ORAFLIGO® JUNIOR gel deluje s pomočjo fizičnih procesov in deluje lokalno.

ORAFLIGO® JUNIOR gel se nanaša enostavno in direktno na poškodovano mesto. S prekrivanjem površine poškodovane ustne sluznice ustvari nezgoda plasti.

ORAFLIGO® JUNIOR gel lahko zmanjša draženje zaradi trde hrane ali tečinka.

Uporabo ORAFLIGO JUNIOR® gela priporočamo čimprej, ob prvih znakih poškodovanega tkiva.

ORAFLIGO® JUNIOR gel priporočamo odraslim in otrokom.

Za otroke mlajše od dveh let priporočamo posvet s svojim zdravnikom.

Gel ima prijeten okus po janézu, ne vsebuje alkohola in je brez vonja ob nanosu.

Ne vsebuje barvili, ki bi poškodovala ustno sluznico.

INDIKACIJE

ORAFLIGO® JUNIOR gel vsebuje naravne aktivne sestavine primerno za otroke in najstnike pri težavah na ustni sluznici: boleči, poškodovani ali otekle dlesni, afte, ustne rane, gingivitis, ugrizi v ustih, vzdrževanje ust na tvoja zarada nošenja opornic ali drugih ortodontskih prizadevilk.

SESTAVINE

Aqua, Macadamia ternifolia seed oil, Aesculus hippocastanum extract, Tocopherol acetate, Centella asiatica extract, Triethanolamine, Carbomer, Trigona foenu-macraeum seed extract, Aloe barbadensis extract, Ilicium verum fruit oil, Imidazolidinyl urea, Hyaluronic acid, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate, Allantoin, Cupressus sempervirens oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Thymus vulgaris oil, Ubiquinone, Propylene glycol, Ascorbic acid, Panthenol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben.

NAVODILA ZA UPORABO ORAFLIGO® JUNIOR gel

ORAFLIGO® JUNIOR gel uporabite 3 krat dnevno po zagotovljeni ustni higijni (npr. čiščenje zob), razen če ni drugače predpisano. Pred in po uporabi si umrite roke. Iztržite majhno količino gela (dovolj za prekritje prizadelega mesta) na čisto konično prst ali na vatrano palčko in jo naneste nezno, direktno na poškodbo. Svetujejo otroku naj se z jezikom ne dotika prizadeve področja vsaj nekaj minut po nanosu gela.

Gel uporabljajte dokler ne opazite popolnega izboljšanja.

ORAFLIGO® JUNIOR gel je hidroskopski - veže vase vodo, zato priporočamo prizadevo področje pred nanosom gela osušiti z vatrano palčko in s tem omogočiti hitrejši učinek delovanja gela. V primeru

pitja ali hranjenja priporočamo ponoven nanos gela. Bodite previdni, da otrok ne nese pokrovčka iz tube v usta. Žato odstranite pokrovček pred vsako uporabo in ga ohranjajte čistega.

PREDVODNOSTNI UKREPI

ORAFLIGO® JUNIOR gel je namenjen le za lokalno rabo v ustih. Ne pogritevajte izdelka.

Pri otrocih mlajših od 12 let priporočamo uporabo gela po razdrobnem odraslini.

Ne nanašajte preveliko količine gela na enkrat.

Če uporabljate ORAFLIGO® JUNIOR gel pri otroku, ga ne nanašajte na zadnjih del ježika ali področje grla.

Za ORAFLIGO® JUNIOR gel hi znamo, da lahko med-

seboj vpliva na zdravila.

V primeru neščnosti ali dojenja se za uporabo ORAFLIGO® JUNIOR gel posvetujte s svojim zdravnikom, zobozdravnikom ali farmacevtom.

Izbogibajte se stika z očmi. V primeru stika z očmi, temeljito splašnite oči z zadostno količino vode.

Če se vaši simptomi ne izboljšajo ali celo poslabšajo, kontakrirajte zdravnika, zobozdravnika ali farmacevta.

Ne uporabljajte ORAFLIGO® gela v primeru alergij ali preobčutljivosti na katerokoli od navedenih sestavin v izdelku.

V primeru vročine, slabosti, težavami z želodcem ali izpuščaji kjerkoli na telesu se takoj posvetujte z zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA:

Hranite na sobni temperaturi, do 25°C v suhem prostoru.

Ne hranite v hladilniku. Ne uporabljajte izdelka po pretoku roki, ki je zapisan na embalaži.

Hranite izven dosegot otrok.

(EN) ORAFLIGO® JUNIOR gel

Please read this leaflet carefully before you start using ORAFLIGO® JUNIOR gel and respect the instructions for use.

Please consult your doctor, dentist or pharmacist if you have any further questions.

DESCRIPTION

Aphthae or oral lesions can cause pain and discomfort. Eating or drinking may make the sore worse.

Mouth ulcers are very common in children and teenagers. ORAFLIGO® JUNIOR is the new gel solution for the treatment of mouth ulcers and oral lesions.

ORAFLIGO® JUNIOR gel relieves the pain, forms a protective layer and seals damaged oral tissue, allowing natural healing.

ORAFLIGO® JUNIOR gel is particularly useful for controlled local treatment.

ORAFLIGO® JUNIOR gel can be easily applied directly to the lesions themselves.

ORAFLIGO® JUNIOR gel can reduce the irritation caused by the intake of solid food and fluids.

ORAFLIGO® JUNIOR gel should be applied as soon as signs and symptoms of oral lesions appear.

ORAFLIGO® JUNIOR gel is suitable for use by adults and

children. Children under 2 years of age: Consult a doctor.

The gel has a pleasant anise taste and the alcohol-free formulation does not sting when applied. Additionally, it contains no colourants, which could aggravate the sensitive mucosa.

INDICATIONS

ORAFLIGO® JUNIOR gel is a soothing and protective gel with natural ingredients, especially developed for children and teenagers suffering from the following types of irritation to the oral mucosa: painful, damaged or bleeding gums, mouth ulcers, oral sores, gingivitis, cheek bites and abrasions from orthodontic braces and other dental appliances.

INGREDIENTS

Aqua, Macadamia ternifolia seed oil, Aesculus hippocastanum extract, Tocopherol acetate, Centella asiatica extract, Triethanolamine, Carbomer, Trigona foenu-macraeum seed extract, Aloe barbadensis extract, Ilicium verum fruit oil, Imidazolidinyl urea, Hyaluronic acid, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate, Allantoin, Cupressus sempervirens oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Thymus vulgaris oil, Ubiquinone, Propylene glycol, Ascorbic acid, Panthenol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben.

INSTRUCTIONS FOR USE

ORAFLIGO® JUNIOR gel can be used 3 times a day after performing oral care (e.g. brushing teeth), unless otherwise prescribed. Wash your hands before and after application.

Squeeze a small amount of gel onto a clean, dry fingertip or cotton bud, sufficient to cover the affected area, and then gently apply it directly to the lesion. Encourage your child not to touch the sore with their tongue for a few minutes, to allow time for the gel to create the protective layer.

Continue applying the gel until the lesion has completely healed.

ORAFLIGO® JUNIOR gel is hygroscopic i.e. it seeks out water. Drying the affected area with a cotton swab prior to application helps soak up excess water (e.g. saliva) on the surface, allowing ORAFLIGO® JUNIOR gel to act quickly.

We recommend reapplying the gel after eating or drinking.

Be careful with the cap, so that your children do not grab it. This must be removed prior to using the gel and replaced after every use to keep it clean.

PRECAUTIONS:

ORAFLIGO® JUNIOR gel is for local use on the oral mucosa. Do not swallow.

It is recommended that children under 12 years of age should use the product under adult supervision.

When applying ORAFLIGO® JUNIOR gel to your child's mouth, do not place the gel on the back of the tongue or throat area. Do not apply excessive amounts of the gel.

Do not use ORAFLIGO® JUNIOR gel if you are allergic (hypersensitive) to any of the ingredients listed.

ORAFLIGO® JUNIOR gel is not known to affect, or to be affected by, any other medicines.

If you are pregnant or breastfeeding, consult your doctor, dentist or pharmacist before using ORAFLIGO® JUNIOR gel.

Avoid contact with eyes. In the event of accidental contact, rinse thoroughly with plenty of water.

Contact a doctor, dentist or pharmacist if your symptoms worsen or do not improve.

If you notice other symptoms such as fever, nausea, stomach upset or rashes elsewhere on your body, consult your doctor immediately.

STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature in a dry place.

Do not refrigerate.

Do not use the product after the expiry date shown on the packaging. Keep out of reach and sight of children.

(D) ORAFLIGO® JUNIOR gel

Apheti oder Läsionen im Mund können zu Schmerzen und Beschwerden führen.

Essen und trinken können die Symptome noch verschlimmern. Aphthen sind bei Kindern und Jugendlichen sehr verbreitet.

ORAFLIGO® JUNIOR ist die neue Gel-Lösung für die Behandlung von Aphthen und alle Verletzungen der Mundschleimhaut.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel lindert die Schmerzen, bildet eine Schutzschicht über dem verletzten Gewebe und fördert somit den natürlichen Heilungsprozess.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel wirkt durch einen physikalischen Prozess und ist deswegen besonders für eine kontrollierte lokale Behandlung geeignet.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel kann direkt und einfach auf die Läsionen aufgetragen werden.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel kann die durch den Verzehr von festen Nahrung und Flüssigkeiten verursachten Reizungen lindern.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel sorgt für die nötige Feuchtigkeit der Mundschleimhaut. Die Behandlung mit ORAFLIGO® JUNIOR Gel sollte schon bei ersten Anzeichen und Symptomen oraler Läsionen beginnen.

ORAFLIGO® Gel ist für Erwachsene und Kinder geeignet.

Für Kinder, die jünger als zwei Jahre sind, wird empfohlen mit ihrem Arzt zu sprechen.

Das Gel hat einen angenehmen Anis-Geschmack. Es ist Alkoholfrei und brennt nicht bei Anwendung. Zudem enthält es keine Farbstoffe, die der empfindlichen Schleimhaut schaden könnten.

ANWENDUNGSGEBIETE

ORAFLIGO® JUNIOR ist ein wohltuendes und schützendes Gel mit natürlichen Inhaltsstoffen. Es wurde vor allem für Kinder und Jugendliche entwickelt, die unter den folgenden, schmerzhaften Läsionen im Mund leiden: Zahrfleischbluten, Aphthen, Bliswunden (Wangen, Zunge), Gingivitis, Verletzungen durch Zahnpfosten undkieferorthopädische Vorrichtungen.

DIE HAUPTBESTANDTEILE

Aqua, Macadamia ternifolia seed oil, Aesculus hippocastanum extract, Tocopherol acetate, Centella asiatica extract, Triethanolamine, Carbomer, Trigona foenu-macraeum seed extract, Aloe barbadensis extract, Ilicium verum fruit oil, Imidazolidinyl urea, Hyaluronic acid, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate, Allantoin, Cupressus sempervirens oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Thymus vulgaris oil, Ubiquinone, Propylene glycol, Ascorbic acid, Panthenol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben.

ANWENDUNG

ORAFLIGO® JUNIOR Gel kann bis zu 3-mal täglich nach der Mundpflege (z. B. Zahneputzen) verwendet werden, es sei denn Ihr Arzt gibt andere Anweisungen. Waschen Sie Ihre Hände bevor und nach dem Auftragen.

Tragen Sie eine kleine Menge des Gels auf eine saubere, trockene Fingerspitze oder Wattestäbchen, genug, dass es die betroffene Fläche bedeckt, und tragen Sie es dann vorsichtig auf die Wunde auf.

Ermüden Sie Ihr Kind, die Wunde für ein paar Minuten nicht mit der Zunge zu berühren, damit das Gel in das Gewebe eindringen kann und sich eine Schutzschicht bildet.

Wiederholen Sie den Prozess bis die Wunde vollkommen verheilt ist.

ORAFLIGO® JUNIOR Gel ist hidroskopsch, das bedeutet es zieht Wasser an. Wenn Sie die betroffene Fläche vor dem Auftragen mit einem Wattestäbchen abtrocknen, absorbiert sie den Überschuss der Feuchtigkeit von der Oberfläche und ermöglichen, dass das ORAFLIGO® JUNIOR Gel schnell wirkt.

Nach dem Essen oder Trinken muss man das Gel erneut auftragen.



Die Tube nach jedem Gebrauch sofort wieder mit der Schraubkappe verschließen. Während des Gebrauchs, die Kappe ausserhalb der Reichweite von Kindern belassen.

VORSICHT

Oraflogo[®] JUNIOR Gel ist nur für lokale Anwendungen auf der Mundschleimhaut geeignet. Nicht verschlucken.
Kinder unter 12 Jahren sollten das Gel unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Tragen Sie nicht zu viel des Gels auf.

Wenn Sie Oraflogo[®] JUNIOR Gel einem Kind geben, sollten Sie das Gel nicht auf den hinteren Teil der Zunge und des Rachens auftragen.

Oraflogo[®] JUNIOR Gel hat keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, reden Sie mit Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker bevor Sie Oraflogo[®] JUNIOR Gel verwenden.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Falls das Gel in Kontakt mit Augen kommt, waschen Sie die Augen gründlich mit Wasser.

Wenn sich die Symptome nicht verbessern oder gar verschlechtern, sollten Sie einen Arzt, Zahnarzt oder Apotheker kontaktieren.

Verwenden Sie das Oraflogo[®] JUNIOR Gel nicht, wenn Sie allergisch (hypersensitivity) auf einen der angegebenen Inhaltsstoffe sind.

Sollten andere Symptome, wie Fieber, Übelkeit, Magenschmerzen oder Hauftauschläge am Körper auftreten, bitte sofort einen Arzt aufsuchen.

AUFBEWAHRUNG

Die geschlossene Tube bei Zimmertemperatur, maximal 25°C, an einem trockenen Ort lagern. Bewahren Sie es nicht im Kühlschrank auf. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, das auf der Packung steht. Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

F L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel

Cette notice contient des informations importantes pour votre traitement. Veillez la lire attentivement avant d'utiliser l'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel tout en respectant les instructions d'utilisation. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre dentiste ou à votre pharmacien.

DESCRIPTION

L'aphie ou l'ulcère de la muqueuse buccale est douloreux et désagréable.

Aliments et boissons peuvent aggraver encore les symptômes.

Les ulcères aphteux sont très fréquents chez les enfants et les adolescents.

Oraflogo[®] JUNIOR est la nouvelle solution de gel pour le traitement d'ulcères aphteux et toutes les lésions de la muqueuse buccale.

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel soulage la douleur, forme une couche protectrice et guérit les tissus oraux en-

dommages, tout en permettant la guérison naturelle. L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel fonctionne à travers le processus physique, étant particulièrement convenable au traitement local contrôlé.

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel s'applique facilement et directement sur les lésions. Couvrant la couche supérieure de l'ulcère de la muqueuse buccale, il forme un bouclier imperceptible sur les tissus endommagés. L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel réduit l'irritation provoquée par la consommation des fluides et des aliments solides.

Il est recommandé de commencer le traitement avec l'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel dès l'apparition premiers signes et symptômes des lésions orales.

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel s'utilise dans le traitement chez les adultes et les enfants. Pour les enfants âgés de moins de 2 ans, nous vous recommandons de parler à votre médecin.

Le gel a un goût d'anis agréable. Il est sans alcool et donc ne brûle pas lors de l'application. En outre, il ne contient pas de colorants, ce qui pourrait nuire à la muqueuse sensible.

INDICATIONS

Oraflogo[®] JUNIOR est un gel apaisant et protecteur avec des ingrédients naturels. Il a été développé spécialement pour les enfants et les adolescents qui souffrent des lésions buccales et douloureuses suivantes: saignement des gencives, ulcères de la bouche, les morsures (joues, de la langue), la gingivite, les blesures causées par des accolades et des appareils orthodontiques.

COMPOSANTS

Aqua, Macadamia ternifolia seed oil, Aesculus hippocastanum extract, Tocopherol acetate, Centella asiatica extract, Triethanolamine, Carbomer, Trigonella foenum-graecum seed extract, Aloe barbadensis extract, Illicium verum fruit oil, Imidazolidinyl urea, Hyaluronic acid, Phenoxethanol, Sodium hydroacetate, Allantoin, Cupressus sempervirens oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Thymus vulgaris oil, Ubiquinone, Propylene glycol, Ascorbic acid, Panthenol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben

MODE D'EMPLOI

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel peut s'appliquer 3 fois par jour, après avoir procéder avec l'hygiène bucco-dentale (par ex. brossage des dents), sauf lorsque autrement prescrit. Laver les mains avant l'application. Mettre une petite quantité de gel, suffisante de couvrir la zone affectée, sur le doigt sec et propre ou sur un bâtonnet ouaté, puis appliquer doucement sur la lesion.

Encouragez votre enfant à ne pas toucher la plaie pendant quelques minutes avec la langue, de sorte que le gel peut pénétrer dans le tissu et forme une couche protectrice.

Continuer à appliquer jusqu'à la guérison complète.

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel est hygroskopique, c'est-à-dire qu'il a tendance à absorber l'humidité. Si vous séchez la zone affectée à l'aide d'un battoir ouaté, vous absorbez l'excès d'eau (par ex. la salive) de la surface, permettant au gel de faire rapidement de l'effet. Après

avoir mangé ou bu il faut parfois réappliquer le gel. Fermez immédiatement le tube après chaque utilisation avec le capuchon. Pendant l'utilisation, garder le capuchon hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS

L'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel est utilisé dans le traitement local de la muqueuse buccale uniquement. Ne pas avaler.

Il est recommandé que les enfants de moins de 12 ans doivent utiliser le produit sous la supervision d'un adulte.

Ne pas appliquer des quantités excessives de gel.

Si vous donnez l'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel à un enfant, ne pas appliquer le gel derrière la langue ou dans la gorge.

Il n'est pas connu si l'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel provoque des interactions avec d'autres médicaments.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin, votre dentiste ou votre pharmacien.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, demandez conseil à votre médecin, à votre dentiste ou à votre pharmacien avant d'utiliser le gel.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux accidentel, rincez soigneusement et abondamment à l'eau courante.

Ne pas utiliser l'ORAFLOGO[®] JUNIOR gel si vous êtes allergique (hypersensibles) à tout ingrédient énuméré.

Si vous remarquez d'autres symptômes tels que la fièvre, des nausées, des maux d'estomac ou éruptions cutanées ailleurs sur votre corps, consultez immédiatement votre médecin.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, à la température ambiante.

Maximum 25°C. Ne pas réfrigérer.

Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption mentionnée sur la boîte. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

CRO Oraflogo[®] JUNIOR gel

Ovaj umetak sadrži korisne informacije. Molimo Vas da prije uporabe Oraflogo[®] JUNIOR gel sve informacije pažljivo pročitate i slijedite upute za uporabu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, pitajte svog liječnika, stomatologa ili ljekarnika.

OPIS

Afte i sva oštećenja oralne sluznice uzrokovati bolove, stvara zaštitni sloj u oštećenom tkivu te omogućuje prirodno zajeđenje.

Oraflogo[®] JUNIOR gel djeluje uz pomoć fizikalnih postupaka i djeluje lokalno.

Oraflogo[®] JUNIOR gel se jednostavno nanosi direktno na oštećeno mjesto.

Oraflogo[®] JUNIOR gel smanjuje iritaciju uzrokovano konzumacijom krute hrane i tekućina.

Upotreba Oraflogo[®] JUNIOR gel preporučamo čini prije, već kod prvih znakova oštećenja sluznice.

Oraflogo[®] JUNIOR gel preporučamo odraslim osobama i djeci. Za djecu mladu od dvije godine, primjenjujte savjetovanja s liječnikom.

Gel ima ugodan okus anisa i formulaciju bez alkohola

tako da ne izaziva pećenje kod primjene. Osim toga, ne sadrži boje, koje bi mogle pogoršati osjetljivu sluznicu.

INDIKACIJE

Oraflogo[®] JUNIOR gel je umirujući i zaštitni gel s prirodnim sastojcima, posebno razvijeni za djecu i mlade obolele od slijedećih vrsta irtacija sluznice usta: bolne, oštećene ili krvareće desni, črevi i ustima, oralni črevi, gingivitis, ugriveni obrazi i ogrebotine od ortodontskih aparatača i ostalih stomatoloških aparatova.

SASTAV

Aqua, Macadamia ternifolia seed oil, Aesculus hippocastanum extract, Tocopherol acetate, Centella asiatica extract, Triethanolamine, Carbomer, Trigonella foenum-graecum seed extract, Aloe barbadensis extract, Illicium verum fruit oil, Imidazolidinyl urea, Hyaluronic acid, Phenoxethanol, Sodium hydroacetate, Allantoin, Cupressus sempervirens oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Thymus vulgaris oil, Ubiquinone, Propylene glycol, Ascorbic acid, Panthenol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Propylparaben.

UPUTE ZA UPOTREBU

Oraflogo[®] JUNIOR gel koristite 3 puta dnevno nakon završene oralne higijene (prije pranja zuba), osim ako nije drugačije propisano. Prije upotrebe temeljito oprite ruke. Istimite malu količinu gel-a dovoljno da prekrijete oštećeno mjesto) na čist vruću strpu ili na vatinari štapići i njegova nanešite direktno na oštećeno mjesto.

Potaknite dijete da ne dodine ranu sa svojim jezikom na nekoliko minuta, kako bi se omogućilo vrijeme da gel stvari zaštiti film.

Vel koristite sve dok ne dođe do poboljšanja. Oraflogo[®] JUNIOR gel je hidroskopon-sa veže vodu i zato preporučujemo da se prije nanošenja gel-a zaščaćeno područje osuši pamučnom krpom i time omogući brže djelovanje gel-a. U slučaju konzumacije jela / vili pića preporučamo ponovno nanošenje gel-a.

Budite oprezni sa čepom da ne dođe u dohat dijeteta. Čep se skida prije svake upotrebe i vraca nakon završene upotrebe kako bi se sačuvala čistoća.

Oraflogo[®] JUNIOR gel je namijenjen za lokalnu upotrebu u usvoj Šupljini.

Ne gutajte proizvod. Preporučujemo da se djeca do 12 godina koriste proizvod pod nadzorom odrasle osobe. Ne primjenjivati velike količine gel-a.

Ako upotrebljavate Oraflogo[®] JUNIOR gel kod djecje, ne nanosite ga na stražnji dio jezika ili na područje grla.

Za Oraflogo[®] JUNIOR gel nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju kontakta s očima, temeljito isperite oči s velikom količinom vode. Ako se simptomi ne ublaži ili ne povuku kontaktirajte liječnika, stomatologa ili ljekarnika.

U slučaju trudnoće i dojenja, prije upotrebe Oraflogo[®] JUNIOR gel-a, posavjetujte se sa svojim liječnikom, stomatologom ili ljekarnikom.

Ne upotrebljavajte Oraflogo[®] JUNIOR gel u slučaju alergije ili preosjetljivosti, bilo koji od navedenih sastojaka.

Ako primjete druge simptome kao što su povišena temperatura, mučnina, želučane smetnje ili osip na drugim mjestima na tijelu, odmah se obratite liječniku.

UVJETI ČUVANJA

Čuvanje na sobnoj temperaturi do 25°C, na suhom mjestu. Ne čuvajte u hladnjaku. Ne upotrebljavajte proizvod nakon isteka roka označen na ambalaži.

Čuvanje izvan dosegaa i pogleda djece.

Contents: 10ml



25°C

Manufacturer: medicinalis⁺ Production of pharmaceutical products d.o.o., Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenia
Distributors: Österreich - Panakea d.o.o., St. Veiter Strasse 34/III, A-9020 Klagenfurt, Schweiz - W3 Solution GmbH, 4ch. De la Bobinette, 1263 Crassier (VD), Danmark - Medic Danmark A/S, Korskindelund 4, DK-2670 Greve, Slovenija - Panakea d.o.o., Savska cesta 10, 1000 Ljubljana

This leaflet was updated: July 2016

www.oraflogo.com