

MOLUSK®

dermalna raztopina

Za odstranjevanje molusk pri virusni okužbi *Molluscum contagiosum*

MOLUSK®

dermalna raztopina

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO,
KER VSEBUJE ZA VAS POMEMBNE PODATKE

Molluscum contagiosum je nalezljiva, benigna virusna okužba kože, ki jo povzroča virus iz družine Poksvirusov. Okužba se kaže v obliki kupolastih buncic ali vozličev na površini kože in se pogosto pojavlja pri otrocih, običajno med 2. in 5. letom starosti, prizadene pa lahko tudi adolescente in odrasle.

MOLUSK® raztopina 10 % kalijevega hidroksida je jedek izdelek z visoko alkalnim pH in z učinkom razkrajanja, ki deluje na površini kože tako, da povzroči denaturacijo beljakovin v tkivu.

Prikaz delovanja MOLUSK® raztopine



NANOS
Nanašajte enkrat na dan, dokler se buncica ne obarva rdeče.



BUNČICA SE OBARVA RDEČE
Po 4 - 6 dneh se koren buncice obarva rdeče, postane razdražen ali vnet. Takrat **PRENEHAJTE Z NANAŠANJEM** izdelka na to buncico.



MOLUSK IZGINE
Po 2 - 5 tednih **molusk** povsem izgine.

NATANČNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA, ZAPISANA V NAVODILU ZA UPORABO

Indikacije

Za lokalno topikalno odstranjevanje molusk pri virusni okužbi **Molluscum contagiosum**.

Navodilo za uporabo

OPOZORILO: IZDELEK JE JEDEK. DELUJE KOROZIVNO. RAZTOPINO NANESITE LE NA PRIZADET PREDDEL KOŽE. PRI UPORABI RAZTOPINE NATANČNO UPOŠTEVAJTE NAVODILO ZA UPORABO.

Izdelek nanesite **enkrat na dan**, razen če vam zdravnik svetuje drugače.

Nanašajte vsak dan, **dokler se ne pojavi rdečica**, razdraženost ali otekline ob korenu buncice, ki se običajno pojavi po 4 - 6 dneh. Na tej točki **prenehajte nanašati** dermalno raztopino na to buncico.

Vnetje je znak, da bo okužba **Molluscum contagiosum** v naslednjih 2 - 5 tednih izginila. Če se vnetje ne pojavi, nadaljujte z nanašanjem raztopine na buncico dokler ne opazite znakov vnetja.

Opozorilo: če nadaljujete z nanašanjem dermalne raztopine na vneto ali razdraženo buncico, lahko na mestu buncice nastane ulceracija.

Ne nanašajte raztopine na posamezno buncico več kot 10 zaporednih dni. Če ste pozabili nanesti raztopino, je naslednji dan ne nanesite dvakrat. Nanesite raztopino le enkrat in nadaljujte, dokler se buncica ne obarva rdeče.

SLO

Kako uporabljati raztopino

Raztopino sme nanašati le odrasla oseba.

Po nanosu je otrokom potrebno preprečiti stik z izdelkom.

KORAK 1: NANOS

Odvrtite pokrov na steklenički in paličko za nanos pomočite v raztopino. S konico čopiča previdno nanesite raztopino na vsako buncico posebej (in pri tem preprečite stik z zdravo kožo okoli buncice, da ne povzročite vnetja).

OPOZORILO: preprečite stik raztopine z zdravo kožo ali katerokoli drugo površino (oblačila, občutljive površine itd.), saj raztopina deluje korozivno.

KORAK 2: POČAKAJTE 1 DO 2 MINUTI (SUŠENJE)

Po nanosu s čopičem, počakajte 1 do 2 minuti, da se raztopina posuši. Otrokom v tem času preprečite stik s predeli kože, kamor ste nanesli raztopino.

KORAK 3: ODSTRANITE (SPERITE)

Ko se nanos posuši, preostanek izdelka odstranite z vodo (s pomočjo z vodo namočene gaze) in si z obilo vode umijte roke.

Nadaljnji nanosi:

Ponovite zgornje korake.

Po prvem nanosu lahko izdelek hranite s paličko, vstavljeno in privito v stekleničko.

Z nanašanjem raztopine prenehajte takoj, ko opazite razdraženost, rdečino ali otekline. Ta stanja kažejo na to, da je postopek nanašanja zaključen, toda buncica bo povsem izginila šele čez nekaj tednov.

Pomembno je, da buncic na, katere ste nanesli dermalno raztopino, ne praskate in se jih ne dotikate ter tako preprečite nadaljnjo širitev okužbe.

Sestava

MOLUSK® je raztopina 10 % kalijevega hidroksida.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Izdelka ne uporabljajte pri otrocih mlajših od dveh let, razen če vam zdravnik svetuje drugače.
- Ne nanašajte na predele, kjer je koža tanka ali občutljiva, kot so sluznica in predel okoli oči. Raztopina ne sme nikakor priti v stik z očmi.
- Ni za uživanje. Ne uporabljajte na predelu obraza.
- Ne uporabljajte v primeru okužene *Molluscum contagiosum*.
- Ne uporabljajte na razdraženi ali z okužbo prizadeti koži in v primeru, da je na koži opaziti rdečino ali znake vnetja.
- Ne uporabljajte na koži, na kateri je opaziti kakršnekoli spremembe.
- Izdelek ni primeren za osebe s sladkorno boleznijo, saj lahko pride do počasnejšega in nepopolnega zdravljenja prizadetih predelov kože.
- Če dojite, izdelka ne uporabljajte na predelih, s katerimi pride v stik dojenček.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino.

Nanos raztopine lahko povzroči začasno srbenje, razdraženost ali pekoč občutek. Na mestu odstranjene moluske se lahko pojavi hiperpigmentacija ali hipopigmentacija. Spremembe v pigmentaciji sčasoma spontano izginejo.

V primeru stika z izdelkom:

- Če izdelek pride v stik z očmi, oči nemudoma 15 minut spirajte z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.



Tipične lezije *Molluscum contagiosum*

- Če izdelek pride v stik z zdravo kožo, predel nemudoma sperite z obilo vode.
- Če izdelek pride v stik s prsti, ne drgnite oči ali sluznice z njimi. Nemudoma si umijte roke.

Druga opozorila

- Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Preprečite stik z oblačili in drugimi materiali, občutljivimi za jedke snovi. Steklenico zavrzite štiri tedne po odprtju. Izdelka ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja izdelka se posvetujte s farmacevtom.

Priporočila:

Molluscum contagiosum je benigna, nalezljiva okužba. Da preprečite širjenje virusa, se izogibajte praskanju, stiku obolelega dela z drugimi posamezniki ("koža na kožo") in stiku preko brisač, gobic za umivanje, kopeli, bazenov itd.

Predstavitev

MOLUSK® dermalna raztopina je zaprt izdelek z aplikatorjem. Vsebuje 3 g raztopine. Navodilo za uporabo hranite do datuma izteka roka uporabnosti.

Navodilo je bilo nazadnje revidirano: **December 2014.**

⚠ OPOZORILO: Izdelek je jedek.



Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo



Številka serije



Ta medicinski pripomoček je skladen z zahtevami uredbe, ki ureja medicinske pripomočke



Uporabno do



Proizvajalec



Navodila za uporabo



Pierre Fabre

Distributer:
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45, PLACE ABEL GANCE
92100 BOULOGNE - FRANCE

Zastopnik za Slovenijo: Oktal Pharma d.o.o.,
Pot k sejmišču 26a, 1000 Ljubljana



Laboratorios Viñas
Provença 386 - 08025 Barcelona
ESPAÑA/SPAIN