

Kombinirani timijanov sirup

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Kombinirani timijanov sirup in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kombinirani timijanov sirup
3. Kako jemati zdravilo Kombinirani timijanov sirup
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kombinirani timijanov sirup
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KOMBINIRANI TIMIJANOV SIRUP IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kombinirani timijanov sirup vsebuje tinkturo vrtno materine dušice, ki olajšuje izkašljevanje in učinkuje protimikrobno ter natrijev bromid, ki je blago pomirjevalo in blaži tudi kašelj.

Sirup se uporablja pri kataralnem vnetju zgornjih dihalnih poti, posebno pri vnetjih z obilnim izločkom, ki jih spremlja kašelj, za ublažitev kašlja, za olajševanje izkašljevanje in pomirjanje krčev gladkih mišičnih vlaken v dihalnih poteh.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO KOMBINIRANI TIMIJANOV SIRUP

Ne uporabljajte zdravila Kombinirani timijanov sirup:

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilni učinkovini ali katerikoli sestavino zdravila.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Kombinirani timijanov sirup:

- če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco (nesposobnost organizma za presnovo) za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom,
- če ste sladkorni bolnik.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Kombiniranega timijanovega sirupa ne priporočamo jemati dalj časa, posebno osebam z ledvičnimi obolenji, zaradi možnosti pojava bromizma. Navedenih dnevnih odmerkov sirupa ne smete prekoračiti brez zdravnikovega navodila.

Če se vam stanje v 5 do 7 dneh ne izboljša ali celo poslabša, morate obiskati zdravnika.

Jemanje drugih zdravil

Ni podatkov.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

Jemanje Kombiniranega timijanovega sirupa med nosečnostjo in dojenjem ni dovoljena.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerikoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Kombinirani timijanov sirup vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila

1 merilna žlička (5 ml) vsebuje 3,5 g saharoze. Če zdravilo jemljete v skladu z navodilom za odmerjanje, zaužijete z vsakim odmerkom od 3,5 g do 10,5 g saharoze. To morajo upoštevati sladkorni bolniki.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO KOMBINIRANI TIMIJANOV SIRUP

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli: naenkrat lahko vzamete 1 žlico (oz. 3 merilne žličke) sirupa 3- do 4-krat dnevno po jedi.

Otroci: starejši od 6 let lahko vzamejo 1 merilno žličko sirupa 3-krat dnevno po jedi; otroci od 2 do 6 let lahko vzamejo ½ do 1 merilno žličko sirupa 3-krat dnevno po jedi.

Ukrepi pri prevelikem odmerjanju

Če ste vzeli večji odmerek kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaužitje prevelikih odmerkov (več kot 1 stekleničko sirupa naenkrat) lahko povzroči zastrupitev z bromidi, ki se kaže kot zmedenost, razdražljivost, slabost, bruhanje, prebavne motnje, koma in paraliza.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Kombinirani timijanov sirup neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Ker vsebuje sladkor, lahko škoduje zobem.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KOMBINIRANI TIMIJANOV SIRUP

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Kombinirani timijanov sirup

- Zdravilni učinkovini sta tinktura vrtno materine dušice in natrijev bromid.
- Pomožne snovi so saharoza, prečiščena voda in natrijev benzoat kot konzervans.

5 ml sirupa (1 merilna žlička) vsebuje 900 mg tinkture vrtno materine dušice (Thymi tinctura) in 200 mg natrijevega bromida (Natrii bromidum).

Izgled zdravila Kombinirani timijanov sirup in vsebina pakiranja

Sirup je bister, rumenorjave barve, sladkega okusa, z vonjem po timijanu.

Steklenička z 200 g sirupa.

Način izdaje zdravila Kombinirani timijanov sirup

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 17.12.2010