

RAZTOPINA GENCIJANE VIOLET

1-% dermalna raztopina

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Raztopina gencijane violet in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Raztopina gencijane violet
3. Kako uporabljati zdravilo Raztopina gencijane violet
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Raztopina gencijane violet
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO RAZTOPINA GENCIJANE VIOLET IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Raztopina gencijane violet je vodno-etanolna raztopina organskega barvila metilrozanolinijevega klorida (gencijana violet), ki ima močno antiseptično delovanje na kožo in sluznice. Preprečuje rast glivic. Mehanizem delovanja še ni raziskan. Protibakterijsko delovanje je povezano z lastnostjo bakterijske celice, da se obarva z metilrozanolinijevem kloridom (po Gramu pozitivne bakterije). Zdravilo pomaga pri okužbah kože in sluznic, ki jih povzročata *Candida albicans* ter pri drugih glivičnih in bakterijskih obolenjih na površini kože, na katerih povzročitelje deluje metilrozanolinijev klorid.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO RAZTOPINA GENCIJANE VIOLET

Ne uporabljajte zdravila Raztopina gencijane violet:

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila,
- če imate razjede na koži in sluznicah.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Zdravilo Raztopina gencijane violet obarva kožo in obleko škrlatno.

Na granuliranem tkivu lahko povzroči trajno obarvanje.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO RAZTOPINA GENCIJANE VIOLET

Pri uporabi zdravila Raztopina gencijane violet natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in otroci: zdravilo nanesite 2- do 3- krat dnevno na kosmu vate (ali vatirani palčki) na obolela mesta kože ali sluznici.

Po nanosu Raztopine gencijane violet za odpravo *Candida albicans* v ustih svetujemo, naj otroci sklonijo glavo, kar zmanjša možnost, da bi zdravilo pogoltnili.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Raztopina gencijane violet kot bi smeli, se lahko pojavi vzdraženost in razjede na sluznici.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Raztopina gencijane violet neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če se pojavi preobčutljivostna reakcija (lokalna vzdraženost, pojav mehurčkov), prenehajte z uporabo.

Zaradi prepegostega ali predolgega zdravljenja kandidioze v ustih, zdravilo lahko povzroči vnetje požiralnika, grla in sapnika, zaužitje zdravila pa slabost, bruhanje, drisko in bolečine v želodcu.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA RAZTOPINA GENCIJANE VIOLET

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 ° C.

Stekleničko shranjujte tesno zaprto.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Raztopina gencijane violet

- Zdravilna učinkovina je metilrozanolinijev klorid (gencijana violet).

- Pomožni snovi sta prečiščena voda in etanol.

1 g dermalne raztopine vsebuje 10 mg metilrozanolinijevega klorida (Methylrosanilini chloridum).

Izgled zdravila Raztopina gencijane violet in vsebina pakiranja

Zdravilo Raztopina gencijane violet je bistra, temno vijolično obarvana raztopina, brez vonja.

V škatli je steklenička z 10 g dermalne raztopine.

Način izdaje zdravila Raztopina gencijane violet

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec:

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 22.09.2011