

Slezov sirup

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Slezov sirup in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Slezov sirup
3. Kako jemati zdravilo Slezov sirup
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Slezov sirup
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO SLEZOV SIRUP IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Slezov sirup vsebuje sluzi slezovih korenin. Te prekrijejo žrelno sluznico in tako zmanjšajo draženje, ki povzroča kašelj.

Slezov sirup se uporablja za pomirjanje suhega, dražečega kašlja. Primeren je za odrasle in otroke.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SLEZOV SIRUP

Ne uporabljajte zdravila Slezov sirup:

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila,
- če ob kašljanju izločate gosto sluz. V tem primeru je potrebno kašelj spodbujati z zdravili, ki pospešujejo izkašljevanje (npr. Sirup za izkašljevanje za odrasle oz. otroke).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Slezov sirup:

- če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco (nesposobnost organizma za presnovo) za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom,
- če ste sladkorni bolnik.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Če se vam stanje v 5 do 7 dneh ne izboljša ali celo poslabša, morate obiskati zdravnika.

Jemanje drugih zdravil

Absorpcija drugega zdravila, vzetega istočasno je lahko upočasnjena.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Slezov sirup skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo lahko jemljete ne glede na obroke hrane.

Nosečnost in dojenje

Ni podatkov.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Slezov sirup vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila

1 merilna žlička (5 ml) vsebuje 4,2 g saharoze. Če zdravilo jemljete v skladu z navodilom za odmerjanje, zaužijete z vsakim odmerkom od 4,2 g do 12,6 g saharoze. To morajo upoštevati sladkorni bolniki.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SLEZOV SIRUP

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli: naenkrat lahko vzamete 2 do 3 merilne žličke (1 žlico) sirupa 3- do 6-krat dnevno.

Otroci: starejši od 2 let, lahko vzamejo 3- do 4-krat dnevno 1 merilno žličko sirupa po jedi; od 4. meseca do 2. leta pa 3- do 4-krat dnevno 1/2 do 1 merilno žličko sirupa, razredčenega s čajem.

Ukrepi pri prevelikem odmerjanju

Ni znanih podatkov o toksičnosti pri prevelikem odmerjanju.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Slezov sirup neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, sirup prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ker vsebuje sladkor, lahko škoduje zobem.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SLEZOV SIRUP

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Stekleničko shranjujte tesno zaprto, zaščiten pred svetlobo.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Slezov sirup

- Zdravilna učinkovina so sluzi slezovih korenin.
- Pomožne snovi so saharoza, prečiščena voda in natrijev benzoat kot konzervans.

5 ml sirupa (1 merilna žlička) vsebuje vodni izvleček iz 164 mg korenin navadnega sleza (*Althaea radix*).

Izgled zdravila Slezov sirup in vsebina pakiranja

Sirup je bister do rahlo moten, rumenkaste barve, sladkega okusa, z vonjem po slezu.

Steklenička s 150 g sirupa.

Način izdaje zdravila Slezov sirup

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Ime in naslov izdelovalca:

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 01.12.2010