

Navodilo za uporabo

Ibuprofen STADA 200 mg peroralni prašek

Za odrasle, mladostnike in otroke s telesno maso nad 20 kg (starost 6 let ali več)
ibuprofen

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Posvetujte se z zdravnikom, če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo:
 - po 3 dneh zdravljenja pri otrocih in mladostnikih,
 - po 3 dneh zdravljenja zvišane telesne temperature ali po 4 dneh zdravljenja bolečin pri odraslih.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Ibuprofen STADA in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ibuprofen STADA
3. Kako jemati zdravilo Ibuprofen STADA
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ibuprofen STADA
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ibuprofen STADA in za kaj ga uporabljamo

Ibuprofen, zdravilna učinkovina v zdravilu Ibuprofen STADA, spada v skupino zdravil, imenovanih nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID – *non-steroidal anti-inflammatory drugs*). Ta zdravila delujejo tako, da spremenijo odziv telesa na bolečine in zvišano telesno temperaturo.

Zdravilo Ibuprofen STADA uporabljamo pri odraslih, mladostnikih in otrocih s telesno maso več kot 20 kg (starost 6 let ali več) za kratkotrajno simptomatsko zdravljenje:

- blagih do zmernih bolečin,
- zvišane telesne temperature.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ibuprofen STADA

NE JEMLJITE zdravila Ibuprofen STADA:

- če ste alergični na ibuprofen ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če se vam je kdaj po jemanju acetilsalicilne kisline ali drugih NSAID pojavil srbeč izpuščaj, otekel obraz, ustnice ali jezik, izcedek iz nosu, težko dihanje ali astma,
- če imate kakšno nepojasnjeno motnjo nastajanja krvi,
- če ste imeli krvavitve iz prebavil ali perforacijo prebavil, povezano s predhodnim zdravljenjem z NSAID,
- če imate ali ste kdaj v preteklosti imeli razjedo na želodcu ali dvanajstniku (peptični ulkus) ali krvavitev v želodcu ali dvanajstniku (vsaj 2 potrjena primera razjede ali krvavitve),
- če imate krvavitev iz krvnih žil v možganih ali kakšno drugo aktivno krvavitev,
- če imate hudo srčno popuščanje,
- če ste v tretjem trimesečju nosečnosti,
- če imate hudo odpoved jeter ali hudo odpoved ledvic,
- če ste hudo dehidrirani (zaradi bruhanja, driske ali nezadostnega uživanja tekočin).

Zdravila Ibuprofen STADA ne uporabljajte pri otrocih, ki imajo telesno maso manjšo od 20 kg ali so mlajši od 6 let, zaradi velike vsebnosti zdravilne učinkovine v zdravilu.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Ibuprofen STADA se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate ali ste kdaj imeli astmo ali kakšno alergijsko bolezen, ker se vam lahko pojavi težko dihanje;
- če imate kakšne bolezni jeter;
- če imate zmanjšano delovanje ledvic;
- če imate ali ste kdaj imeli kakšno črevesno bolezen (ulcerozni kolitis, Crohnovo bolezen);
- če imate težave s srcem, vključno s srčnim popuščanjem, angino pectoris (bolečine v prsnem košu), ali če ste imeli srčni infarkt, obvodno ("bypass") operacijo, bolezen perifernih arterij (slab pretok v nogah ali stopalih zaradi zoženih ali zamašenih arterij) ali kakršno koli obliko možganske kapi (vključno z "mini kapjo" ali prehodno možgansko ishemijo (TIA – *transient ischaemic attack*));
- če imate visok krvni tlak, sladkorno bolezen, visok holesterol, srčno bolezen ali možgansko kap v družini, ali če kadite;
- če imate določene bolezni kože (sistemski eritematozni lupus (SLE – *systemic lupus erythematosus*) ali mešano bolezen vezivnega tkiva). Če imate kakšno resno kožno reakcijo, na primer eksfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom ali toksično epidermalno nekrolizo. Zdravilo Ibuprofen STADA morate takoj prenehati uporabljati ob prvem pojavu kožnega izpuščaja, poškodb sluznice ali kakšnega drugega znaka alergijske reakcije;
- če imate določene dedne motnje nastajanja krvi (npr. akutno intermitentno porfirijo);
- če imate ali ste kdaj imeli visok krvni tlak in/ali srčno popuščanje;
- zdravniški nadzor je še zlasti priporočljiv neposredno po večji operaciji;
- če imate seneni nahod, nosne polipe ali kronično obstruktivno bolezen dihal, obstaja večje tveganje za alergijske reakcije. Alergijske reakcije se lahko pojavijo kot napadi astme (t. i. analgetična astma), Quinckejev edem ali urtikarija;
- med noricami (varicello) se je treba izogibati uporabi zdravila Ibuprofen STADA;
- če imate motnje strjevanja krvi;
- med dolgotrajno uporabo zdravila Ibuprofen STADA je treba redno kontrolirati jetrne izvide, delovanje ledvic in krvno sliko.
- sočasna uporaba z NSAID, vključno s specifičnimi zaviralci ciklooksigenaze-2, poveča tveganje za neželene učinke (glejte poglavje "Druga zdravila in zdravilo Ibuprofen STADA"), zato se je takšni sočasni uporabi treba izogibati.

Neželene učinke je mogoče omejiti, če uporabljate najmanjši učinkovit odmerek najkrajši možni čas. Tveganje za neželene učinke je večje pri starejših osebah.

Na splošno lahko stalna uporaba (različnih vrst) zdravil za zdravljenje bolečin (analgetikov) povzroči trajne hude težave z ledvicami. To tveganje se lahko poveča v primeru telesnega napora, ki ga spremljata izguba soli in dehidracija. Zato se mu je treba izogibati.

Dolgotrajna uporaba katerega koli analgetika za zdravljenje glavobola lahko glavobole poslabša. Če se pojavi takšna situacija ali obstaja sum nanjo, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z zdravnikom. Pri bolnikih, ki imajo kljub redni uporabi zdravil za zdravljenje glavobola (ali zaradi nje) pogoste ali vsakodnevne glavobole, obstaja sum na diagnozo glavobola zaradi prekomerne uporabe zdravil.

NSAID lahko prikrijejo simptome okužbe ali zvišano telesno temperaturo.

Protivnetna zdravila/zdravila za zdravljenje bolečin, kakršno je ibuprofen, so morda lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap, zlasti če so uporabljena v velikih odmerkih. Ne prekoračite priporočenega odmerka in priporočenega trajanja zdravljenja.

Če kaj od zgoraj navedenega velja za vas, se posvetujte z zdravnikom, preden uporabite zdravilo Ibuprofen STADA.

Otroci in mladostniki

Pri dehidriranih otrocih in mladostnikih obstaja tveganje za okvaro ledvic.

Zdravila Ibuprofen STADA ne uporabljajte pri otrocih, ki imajo telesno maso manjšo od 20 kg ali so mlajši od 6 let, zaradi velike vsebnosti zdravilne učinkovine v zdravilu.

Druga zdravila in zdravilo Ibuprofen STADA

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Nekatera druga zdravila lahko vplivajo na zdravilo Ibuprofen STADA in to zdravilo lahko vpliva na nekatera druga zdravila. To na primer velja za:

- zdravila, ki so antikoagulanti (tj. zdravila za redčenje krvi/proti strjevanju krvi, npr. acetilsalicilna kislina, varfarin ali tiklopidin).
- zdravila, ki znižujejo visok krvni tlak (zaviralci ACE, kot je kaptopril, antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, kot je atenolol, ali antagonisti angiotenzinskih receptorjev II, kot je losartan).

Tudi nekatera druga zdravila lahko vplivajo na zdravljenje z zdravilom Ibuprofen STADA, oziroma zdravilo Ibuprofen STADA vpliva nanje. Zato se morate pred uporabo zdravila Ibuprofen STADA skupaj z drugimi zdravili vedno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Še zlasti morate zdravniku ali farmacevtu povedati, če jemljete:

acetilsalicilno kislino ali kakšne druge NSAID (protivnetna zdravila in zdravila za zdravljenje bolečin)	ker to lahko poveča tveganje za razjede ali krvavitve iz prebavil
digoksin (za zdravljenje srčnega popuščanja)	ker se učinek digoksina lahko poveča
glukokortikoide (zdravila, ki vsebujejo kortizon ali kortizonu podobne zdravilne učinkovine)	ker to lahko poveča tveganje za razjede ali krvavitve iz prebavil
antiagregacijska zdravila (zdravila proti sprijemanju trombocitov)	ker to lahko poveča tveganje za krvavitve
acetilsalicilno kislino (v majhnih odmerkih)	ker se lahko učinek na redčenje krvi zmanjša
zdravila za redčenje krvi (na primer varfarin)	ker lahko ibuprofen poveča učinek teh zdravil
fenitoin (za zdravljenje epilepsije)	ker se učinek fenitoina lahko poveča
selektivne zaviralce ponovnega privzema serotonina (zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje depresije)	ker lahko povečajo tveganje za krvavitve iz prebavil
litij (zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje bipolarni motnje in depresije)	ker se učinek litija lahko poveča
probenecid ali sulfinpirazone (zdravila za zdravljenje protina)	ker lahko upočasnijo izločanje ibuprofena
zdravila za visok krvni tlak ali tablete za odvajanje vode (diuretike)	ker lahko ibuprofen zmanjša učinke teh zdravil in ker lahko obstaja večje tveganje za okvaro ledvic
diuretike, ki varčujejo s kalijem	ker to lahko povzroči hiperkaliemijo
metotreksat (zdravilo za zdravljenje raka ali revmatizma)	ker se učinek metotreksata lahko poveča
takrolimus ali ciklosporin (zdravila, ki zavirata delovanje imunskega sistema)	ker se lahko pojavi okvara ledvic
zidovudin (zdravilo za zdravljenje HIV/aidsa)	ker lahko uporaba zdravila Ibuprofen STADA

	poveča tveganje za krvavitev v sklepe ali za krvavitev, ki povzroči oteklost pri HIV (+) bolnikih s hemofilijo.
sulfonilsečnine (zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni)	možna so medsebojna delovanja
kinolonske antibiotike	ker se lahko poveča tveganja za epileptične krče
zaviralce CYP2C9	Sočasna uporaba ibuprofena z zaviralci CYP2C9 lahko poveča izpostavljenost ibuprofenu (substrat CYP2C9). V študiji z vorikonazolom in flukonazolom (ki sta zaviralca CYP2C9) so ugotovili za približno 80 do 100 % večjo izpostavljenost S(+)-ibuprofenu. Med sočasno uporabo z močnimi zaviralci CYP2C9 pride v poštev zmanjšanje odmerka ibuprofena, zlasti če so veliki odmerki ibuprofena uporabljeni z vorikonazolom ali flukonazolom.

Zdravilo Ibuprofen STADA skupaj z alkoholom

Če med jemanjem zdravila Ibuprofen STADA pijete alkohol, je verjetnejši pojav nekaterih neželenih učinkov, na primer tistih na prebavilih ali osrednjem živčevju.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Tega zdravila ne jemljite v zadnjih 3 mesecih nosečnosti. Uporabi tega zdravila se izogibajte v prvih 6 mesecih nosečnosti, razen če vam zdravnik svetuje drugače.

Dojenje

V materino mleko preide le malo ibuprofena in produktov njegove razgradnje. Ker doslej ni znanih škodljivih učinkov za dojenčke, med kratkotrajno uporabo priporočenih odmerkov ibuprofena dojenja po navadi ni treba prekiniti.

Plodnost

To zdravilo spada v skupino zdravil (NSAID), ki lahko zmanjšajo plodnost pri ženskah. Učinek po prenehanju uporabe zdravila izgine.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med uporabo zdravila Ibuprofen STADA se lahko pojavijo neželeni učinki, na primer utrujenost, motnje vida in omotica. Zaradi tega se lahko v posameznih primerih zmanjša reakcijska sposobnost ter poslabša sposobnost za aktivno sodelovanje v cestnem prometu in uporabo strojev. To še posebej velja v kombinaciji z alkoholom. Zgodí se lahko, da se niste več zmožni dovolj hitro in ustrezno odzvati na nepričakovane in nenadne dogodke. Če se vam pojavijo takšni učinki, ne upravljajte vozil, ne uporabljajte strojev in ne izvajajte nobenih drugih nevarnih opravil.

Zdravilo Ibuprofen STADA vsebuje izomalt 720

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Ibuprofen STADA

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali

farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

Telesna masa (starost)	Enkratni odmerek	Največji dnevni odmerek
od 20 kg do 29 kg (otroci: od 6. do 9. leta)	200 mg ibuprofena (1 vrečica)	600 mg ibuprofena (3 vrečice)
od 30 kg do 39 kg (otroci: od 10. do 11. leta)	200 mg ibuprofena (1 vrečica)	800 mg ibuprofena (4 vrečice)
≥ 40 kg (mladostniki od 12. leta starosti in odrasli)	200–400 mg ibuprofena (1–2 vrečici)	1.200 mg ibuprofena (6 vrečic)

Pri otrocih in mladostnikih odmerjanje zdravila Ibuprofen STADA temelji na telesni masi (TM) in starosti, v tem zaporedju, praviloma od 7 do 10 mg/kg TM v enkratnem odmerku do največ 30 mg/kg TM v celotnem dnevnem odmerku.

Ustrezni presledek med odmerki je treba določiti glede na simptomatiko in celoten dnevni odmerek. Presledek med odmerki mora biti vsaj 6 ur.

Ne prekoračite priporočenega odmerka.

Če je treba to zdravilo pri otrocih in mladostnikih uporabljati več kot 3 dni, ali če se simptomi poslabšajo, se je treba posvetovati z zdravnikom.

Če je pri odraslih to zdravilo potrebno uporabljati več kot 3 dni v primeru zvišane telesne temperature ali več kot 4 dni za zdravljenje bolečine, ali če se simptomi poslabšajo, se je treba posvetovati z zdravnikom.

Odmerjanje pri starejših osebah:

Posebne prilagoditve odmerjanja niso potrebne. Zaradi profila možnih neželenih učinkov (glejte poglavje 2: "Opozorila in previdnostni ukrepi") je treba starejše bolnike posebej skrbno nadzirati.

Način uporabe

peroralna uporaba

Celotno vsebino vrečice stresite v usta. Peroralnega praška ni treba jemati s tekočino, ker se raztopi na jeziku in ga pogoltnete s slino. Zdravilo Ibuprofen STADA je mogoče uporabljati v okoliščinah, ko ni na voljo tekočine.

Priporočljivo je, da bolniki, ki imajo občutljiv želodec, to zdravilo vzamejo med jedjo.

Trajanje uporabe

Zdravilo je namenjeno le kratkotrajni uporabi. Jemati morate najmanjši odmerek najkrajši čas, ki je potreben za ublažitev vaših simptomov.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ibuprofen STADA, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ibuprofen STADA, kot bi smeli, ali če so zdravilo po nesreči vzeli otroci, se glede tveganja in potrebnega ukrepanja vedno posvetujte z zdravnikom ali pa se odpravite v najbližjo bolnišnico.

Simptomi lahko vključujejo slabost, bolečine v trebuhu, bruhanje (lahko vsebuje sledove krvi), glavobol, zvonjenje v ušesih, zmedenost in ritmične gibe oči. Pri večjih odmerkih so poročali o zaspanosti, bolečinah v prsnem košu, razbijanju srca, izgubi zavesti, epileptičnih krčih (predvsem pri otrocih), šibkosti in omotici, krvi v urinu, občutku hladu in težavah z dihanjem.

Poleg tega obstaja možnost krvavitev iz prebavil in motenj delovanja jeter in ledvic. Pojavijo se lahko tudi padec krvnega tlaka, zmanjšano dihanje (depresija dihanja) ter modro in rdeče obarvanje kože in

sluznic (cianoza).

Specifičnega antidota ni.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Ibuprofen STADA

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Preprosto sledite zgornjim navodilom o tem, kako jemati zdravilo, in ga ne vzemite več kot je svetovano.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pojavi se vam lahko kateri od znanih neželenih učinkov NSAID. Če se to zgodi, ali če vas skrbi, nehajte jemati to zdravilo in se čim prej posvetujte s svojim zdravnikom. Starejši bolniki, ki jemljejo to zdravilo, imajo večje tveganje za pojav težav, povezanih z neželenimi učinki.

Neželene učinke je mogoče omejiti na najmanjšo mero, če jemljete najmanjši odmerek najkrajši čas, potreben za ublažitev simptomov.

Takoj PRENEHAJTE JEMATI to zdravilo in se posvetujte z zdravnikom, če se vam pojavi kaj od naslednjega, kajti to so lahko znaki hudih neželenih učinkov:

- hude težave z želodcem, zgaga ali bolečine v trebuhu,
- bruhanje krvi ali bruhanje vsebine, podobne kavni usedlini,
- črno blato ali kri v urinu,
- pride lahko do resne kožne reakcije, poznane kot sindrom DRESS. Simptomi sindroma DRESS vključujejo: kožne izpuščaje, povišano telesno temperaturo, zatekanje bezgavk in povečanje števila eozinofilcev (vrsta belih krvničk),
- kožne reakcije, na primer srbeči izpuščaji,
- težko dihanje in/ali otekanje obraza ali žrela,
- utrujenost skupaj z izgubo apetita,
- vnetje žrela skupaj z razjedami v ustih, utrujenostjo in zvišano telesno temperaturo,
- močna krvavitev iz nosu ali kožna krvavitev,
- nenormalna utrujenost skupaj z zmanjšanim izločanjem urina,
- otekllost obraza, stopal ali nog,
- bolečine v dojkah,
- motnje vida.

Zdravniku povejte, če imate katerega od naslednjih neželenih učinkov, če se ti poslabšajo ali če opazite neželene učinke, ki niso naštetih tukaj.

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- prebavne težave, na primer zgaga, bolečine v trebuhu, slabost (siljenje na bruhanje), težave z želodcem, bruhanje, vetrovi (napenjanje), driska, zaprtost in rahlo izgubljanje krvi v želodcu in/ali črevesju, ki lahko v izjemnih primerih povzroči anemijo.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- razjede na prebavilih, včasih s krvavitvijo in predrtjem (perforacijo), vnetje ustne sluznice z razjedami (ulcerozni stomatitis), vnetje želodčne sluznice (gastritis), poslabšanje kolitisa in Crohnove bolezni;
- motnje osrednjega živčevja, na primer glavobol, omotica, nespečnost, vznemirjenost, razdražljivost ali utrujenost;
- motnje vida;

- različni kožni izpuščaji;
- alergijske reakcije, na primer izpuščaj na koži, srbenje in napadi astme (lahko s padcem krvnega tlaka). Takoj morate prenehati uporabljati zdravilo Ibuprofen STADA in obvestiti zdravnika.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- zvonjenje v ušesih (tinitus);
- okvara ledvic (papilarna nekroza) in zvišana koncentracija sečne kisline v krvi.

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- v povezavi z zdravljenjem z NSAID so bili opisani otekanje (edemi), visok krvni tlak (hipertenzija) in srčno popuščanje;
- vnetje požiralnika ali trebušne slinavke, nastanek membranam podobnih zožitev v tankem in debelem črevesu (intestinalne diafragmalne strikture);
- med okužbo z noricami (varicello) so se pojavile resne okužbe kože in zapleti na mehkih tkivih;
- izločanje manj urina, kot je normalno, in otekanje (zlasti pri bolnikih z visokim krvnim tlakom ali zmanjšanim delovanjem ledvic); otekanje (edemi) in moten urin (nefrotski sindrom); vnetna ledvična bolezen (intersticijski nefritis), ki lahko povzroči akutno odpoved ledvic. Če se vam pojavi kateri od zgoraj naštetih simptomov ali če se na splošno slabo počutite, nehajte jemati zdravilo Ibuprofen STADA in se takoj posvetujte z zdravnikom, ker so to lahko prvi znaki okvare ledvic ali ledvične odpovedi;
- težave pri nastajanju krvnih celic – prvi znaki so: zvišana telesna temperatura, vnetje žrela, povrhnje razjede v ustih, gripi podobni simptomi, huda izčrpanost, krvavitve iz nosu in na koži. V takšnem primeru morate takoj nehati jemati zdravilo in se posvetovati z zdravnikom. Izvajati ne smete nobenega samozdravljenja z zdravili za zdravljenje bolečin (analgetiki) ali zdravili, ki znižujejo telesno temperaturo (antipiretiki);
- psihotične reakcije in depresija;
- med uporabo določenih zdravil za zdravljenje bolečin (NSAID) je bilo opisano poslabšanje z okužbami povezanih vnetij (npr. nekrotizirajoči fasciitis). Če se med uporabo zdravila Ibuprofen STADA pojavijo ali poslabšajo znaki okužbe, morate brez odlašanja obiskati zdravnika. Ugotoviti je treba, ali je potrebno zdravljenje s protimikrobnimi zdravili/antibiotiki.
- visok krvni tlak, vaskulitis, palpitanje (razbijanje srca), srčno popuščanje, srčni infarkt;
- moteno delovanje jeter (prvi znak je lahko spremenjena barva kože), okvara jeter, zlasti med dolgotrajnim zdravljenjem, odpoved jeter, akutno vnetje jeter (akutni hepatitis);
- med uporabo ibuprofena so opažali simptome aseptičnega meningitisa s togostjo vratu, glavobolom, slabostjo (siljenjem na bruhanje), bruhanjem, zvišano telesno temperaturo ali zamegljeno zavestjo.
Verjetnost za to je večja pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi (SLE, mešana bolezen vezivnega tkiva). Če se pojavijo, se posvetujte z zdravnikom.
- hude oblike kožnih reakcij, npr. izpuščaj na koži s pordelostjo in nastankom mehurjev (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom), izpadanje las (alopecija);
- hude splošne preobčutljivostne reakcije.

Zdravila, kakršno je zdravilo Ibuprofen STADA, lahko spremlja nekoliko večje tveganje za srčni infarkt ("miokardni infarkt") ali možgansko kap. Glejte poglavje 2.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ibuprofen STADA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalnem vsebniku za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ibuprofen STADA

- Zdravilna učinkovina je ibuprofen.
- Ena vrečica vsebuje 200 mg ibuprofena.
- Druge sestavine zdravila so: izomalt 720, brezvodna citronska kislina, acesulfam (E950), glicerildistearat (tip I) in aroma limone (vsebuje naravne aromatične pripravke, naravnim identične aromatične snovi, maltodekstrin, α -tokoferol (E307)).

Izgled zdravila Ibuprofen STADA in vsebina pakiranja

Zdravilo Ibuprofen STADA je bel ali skoraj bel peroralni prašek z aromo limone v vrečicah.

Pakiranja s 6, 10, 12 in 20 vrečicami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Ibuprofen STADA

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel

Nemčija

Izdelovalci

Biofabri, S.L.

A Relva, s/n, O Porriño

36400 Pontevedra

Španija

Farmalider S.A
C/Aragoneses, 2
28108 Madrid
Španija

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
61118 Bad Vilbel
Nemčija

Edefarm, S.L
Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117
46191 Villamarchante, Valencia
Španija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Nemčija:	Ibuprofen AL direkt 200 mg Pulver zum Einnehmen
Hrvaška:	Ibudolor 200 mg oralni prašek u vrećici
Poljska:	Ibudolor Quick
Romunija:	Buproless 200 mg Pulbere orală
Slovaška:	Ibuprofen STADA 200 mg peroralny prášok
Slovenija:	Ibuprofen STADA 200 mg peroralni prašek

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 29.3.2019.