

Navodila za uporabo

Vaginalne globule

Sestava

1 vaginalna globula (skupna masa: 1,7 g) vsebuje: 5 mg natrijevega hialuronata, 10 mg sinteznega vitamina E, izvlečke: azijski vodni popnjak 60 mg, slez 60 mg, kamilica 60 mg, eterično olje melalevke 60 mg; 20 mg koloidnega silicijevega dioksida in 1483 mg polsinteznih gliceridov.

Uporaba

Vaginalne globule Feminella Hyalosoft vlažijo vaginalno sluznico, kadar je ta suha zaradi hormonskih sprememb v vseh življenjskih obdobjih, še posebej med menopavzo, po porodu, med dojenjem ali zaradi kemo- in radioterapije.

Zaradi svojih vlažilnih lastnosti Feminella vaginalne globule blažijo simptome vaginalne atroije, kot so srbečica, pekoč občutek in občutek napetosti ali neudobja med spolnim odnosom.

Odmerjanje

Uporabite 1 vaginalno globulo na dan 10 dni oz. kot vam je svetoval vaš zdravnik.

Za lajšanje izsušenosti vaginalne sluznice med menopavzo:

Začetni odmerek: 1 vaginalna tableta na dan, 10-20 dni.

Vzdrževalni odmerek: 1 vaginalna globula dvakrat na teden.

Način uporabe

Feminella vaginalne globule so namenjene samo za vaginalno uporabo.

Odstranjevanje globule iz pretisnega omota: odlomite eno globulo s traku. Film držite z obema rokama med palcem in kazalcem in počasi povlecite narazen. Previdno odstranite globulo s plastičnega i lma. S prstom nežno vstavite globulo globoko v nožnico. Najbolje, da globulo vstavite pred spanjem.

Kontraindikacije

Pri sumu ali pri znani preobčutljivosti ali alergiji na katerokoli sestavino izdelka.

Opozorila

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, pretisne omote shranjujte v škatli za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo.

Ne uporabljajte sočasno z drugimi vaginalnimi globulami (npr. vaginalnimi kontraceptivi) ali s kondomi. Ne uporabljajte med menstruacijo ali pri močnem izcedku iz nožnice. Med nosečnostjo smete izdelek uporabljati le po nasvetu zdravnika. Dolgotrajna uporaba izdelka lahko redko povzroči preobčutljivostne reakcije. V takih primerih prenehajte z uporabi in se posvetujte s svojim zdravnikom. Globul ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je odtisnjen na embalaži. Pred uporabo si temeljito umijte roke. Globulo vstavite takoj, ko ste jo odstranili iz pretisnega omota. Izdelka ne uporabljajte, če je pretisni omot poškodovan.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Izdelovalec

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

A-2102 Bisamberg, Avstrija