

Obesimed® Max Forte

Formula za blokiranje maščob in ogljikovih hidrato

- Za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti
- Zmanjša absorpcijo maščob, sladkorja in ogljikovih hidrato iz vaše prehrane
- Zmanjša apetit
- Znanstveno dokazani učinki

Slošna pripomočka: Obesimed® Max Forte je medicinski pripomoček, razreda IIa, certificiran v skladu z določbami Direktive 93/42/EGS. Natančno preberite navodila, tudi če ste ta izdelek že uporabljali. Informacije so bile morda spremenjene v skladu z novimi raziskavami in ugotovitvami v času, od kar ste nazadnje odprli škatlico. Shranite navodilo, morda ga boste že zelo ponovno pregledati. Obesimed® Max Forte lahko razvije ustrezen učinek le, če ga jemljete v skladu z navodili.

Način uporabe in vsebina:

Pakiranje s 30 tabletami

- 1 tablet Obesimed® Max Forte vsebuje 500 mg Omtec XS®, 375 mg Omtec 50®.
- Druge sestavine: mikrokristalinična celuloza, magnezijev stearat.

Odmerjanje in uporaba: Obesimed® Max Forte je namenjen odraslim, starejšim od 18 let. Zasnovan je za oralno jemanje. Priporočen odmerek je z tableti, eno uro pred vsakim obrokom s kozarcem (250 ml) vode, 3-krat na dan. Vsak dan jemljite multivitaminske in mineralne pripravke, medtem ko hujšate in uporabljajte Obesimed® Max Forte. Obesimed® Max Forte znižuje raven nekaterih vitaminov in mineralov, ki jih telo absorbira. Po možnosti vzemite vitaminsko-mineralni dodatek pred spanjem in si s tem zagotovite, da vaše telo absorbira vitamine in minerale.

Ne uporabljajte dlje kot 30 dni v enem obdobju zdravljenja. Zdravljenje lahko nadaljujete po 4 dneh.

Prehrana in hujšanje: Prekomerno telesno maso pogosto povzročajo prekomerno mastna in visoko kalorična živila. To so živila, kot so hitra hrana, prigrizki z veliko maščobe, živila, ki vsebujejo veliko sladkorja in škroba, kot so torte, pite in piškoti. Ta živila telesu pogosto zagotavljajo več kalorij, kot jih potrebuje – odvečna energija se shrani v maščobah.

Kako deluje Obesimed® Max Forte: Omtec 50® je naravna vlaknina z visoko kapaciteto vezave lipidov. Pomaga nevtralizirati kalorije iz živil z visoko vsebnostjo maščob. V želodcu tvori gelu podobno snov, ki se meša s hrano. Hkrati izvleček Omtec XS® zavira encim trebušne slinavke alfaamilazo za prebavo škroba. Moti proces prebave ogljikovih hidrato. Pri tem se maščobe, sladkorji in ogljikovi hidrati odstranijo iz hrane in se vežejo v netopno obliko. Te vezane maščobe, ogljikovi hidrati in sladkorji ne vstopijo v presnovni cikel, ampak se izločijo neprebavljeni. Vnos kalorij iz maščob, sladkorja in ogljikovih hidratoval se znatno zmanjša. Izvleček Omtec XS® upočasni tudi hitro absorpcijo ogljikovih hidratoval in ugodno vpliva na raven sladkorja v krvi, kar privede do manjše želje po jedi.

Omejitve uporabe:

Obesimed® Max Forte se lahko uporablja za obdobja, daljša od štirih tednov, če upoštevate naslednje omejitve ob uporabi:

- pred dolgotrajno uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom;

- ne jemljite zdravil (npr. kontracepcijskih zdravil), vitaminov ali esencialnih maščobnih kislin hkrati z izdelkom Obesimed® Max Forte; peroralna zdravila je treba jemati 1 uro pred ali 4 ure po uporabi izdelka Obesimed® Max Forte; pred uporabo Obesimed® Max Forte se posvetujte s svojim zdravnikom, če morate jemati zdravila ob glavnem obroku;
- v primeru zaprtja ali drugih neželenih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Stranski učinki:

- škodljivi neželeni učinki niso znani, vendar lahko po zaužitju izdelka Max Forte začasno občutite sitost. Ta po navadi izgine v kratkem času;
- osebe z občutljivim želodcem ali črevesjem lahko občutijo nelagodje v trebuhu, pline ali zaprtje. Če se neželeni učinki nadaljujejo, je treba odmerek zmanjšati ali jemanje prekiniti.

Interakcije: Visoka sposobnost vezave maščob Obesimed®-a Max Forte lahko vpliva tudi na absorpcijo v maščobah topnih vitaminov in zdravilnih učinkovin zdravil. To zadeva na primer hormone v kontracepcijskih tabletah ali v pripravkih, ki se uporabljajo za zdravljenje motenj menopavze. Peroralna zdravila je treba jemati 1 uro pred ali 4 ure po uporabi izdelka Obesimed® Max Forte.

Če imate neželene učinke se posvetujte z zdravnikom.

Kontraindikacije:

Ne uporabljajte Obesimed® Max Forte če:

- ste preobčutljivi ali alergični na eno od sestavin;
- imate ali ste imeli gastrointestinalne motnje (npr. refluki, gastritis, ventrikularni čir ali čir dvanaestnika, Chronova bolezen, ulcerozni kolitis, divertikulitis), znače črevesne obstrukcije (trenutni ali obstoječi mehanični ali paralitični ileus), gastroperezo pri diabetikih z nevropatijo, črevesne polipe ali obstoječe hude prebavne motnje (zaprtje);
- jemljete varfarin (sredstvo za redčenje krvi);
- imate prenizko telesno maso (indeks telesne mase (ITM) <18,5);
- ste noseči ali dojite;
- ni primereno za dojenčke ali malčke;
- otroci in mladostniki naj Obesimed® Max Forte uporabljajo le po posvetu z zdravnikom.

!

Opozorila:

- Tablet ne žvečite ali grizite.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ne uporabljajte, če je blister poškodovan.



Shranjevanje: Shranjujte v suhem prostoru med 5 in 25 °C.



Rok uporabe: Uporaba izdelka Obesimed® Max Forte po pretečenem datumu uporabe, ki je odtisnjena na embalaži, ni pripočljiva.

Datum zadnjega pregleda teh informacij:

junij 2020 • 073606BY - V1.2



Proizvajalec:
PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Proizvedeno na Nizozemskem.

Zastopnik za Slovenijo:

DIFAR d.o.o.,
Pernetova ulica 1, 1236 Trzin, 01-564-11-95
www.difar.si

CE 0481