

24085

Aktivni učinkovini sta Omtec 50® in izvleček Omtec XS®. Omtec 50® je naravna vlaknina z visoko kapaciteto vezave lipidov. Pomaga nevtralizirati kalorije iz živil z visoko vsebnostjo maščob. Izvleček Omtec XS® zavira encim trebušne slinavke alfa-amilazo za prebavo škroba. Moti proces prebave ogljikovih hidratov. V Obesimedu® naravna snov Omtec 50® skupaj z izvlečkom Omtec XS® v želodcu tvori gelu podobno snov. Ta gelu podobna snov se meša s hrano. V tem procesu se maščobe, ogljikovi hidrati in sladkorji odstranijo iz hrane in se vežejo v netopni obliki. Te vezane maščobe, ogljikovi hidrati in sladkorji ne vstopijo v presnovni cikel, ampak se izločijo neprebavljeni.

Sestavine: 1 tableta Obesimed® Max Forte vsebuje 500 mg Omtec XS®, 375 mg Omtec 50®, mikrokristalinično celulozo, magnezijev stearat.

Odmerjanje in uporaba:

Obesimed® Max Forte je zasnovan za oralno jemanje. Priporočen odmerek je 2 tableti, eno uro pred vsakim obrokom s kozarcem (250 ml) vode, 3-krat na dan.

Omejitve uporabe:

Ne uporabljajte dlje kot 30 dni

v enem obdobju zdravljenja. Zdravljenje lahko nadaljujete po 4 dneh prekinitve, če:

- se pred dolgotrajno uporabo izdelka posvetujete z zdravnikom.
- ne jemljete zdravil (npr. kontracepcijskih zdravil), vitaminov ali esencialnih maščobnih kislin hkrati z izdelkom Obesimed® Max Forte; peroralna zdravila je potrebno jemati 1 uro pred ali 4 ure po uporabi Obesimed® Max Forte.

KAKO DELUJE OBESIMED® MAX FORTE?

1. Tableta doseže želodec.
2. Tableta tvori gelu podobno snov, ki zapolni želodec.
3. Obesimed® Max Forte zapusti telo na povsem naraven način.

Obesimed® Max Forte

Blokira maščobe, sladkor in ogljikove hidrate

Vsebina: 30 tablet + Navodila za uporabo

 Pred uporabo preberite navodila za uporabo

 **Opozorilo:**

Ne jemljite Obesimed® Max Forte, če:

- ste preobčutljivi ali alergični na eno od sestavin;
- imate ali ste imeli gastrointestinalne motnje (npr. refluks, gastritis, vertikalni čir ali čir dvanajstnika, Chronovo bolezen, ulcerozni kolitis, divertikulitis), znake črevesne obstrukcije (trenutni ali obstoječi mehanski ali paralični ileus), gastroperezo pri diabetikih z nevropatijo, črevesne polipe ali


obstoječe hude prebavne motnje (zaprtje);

- v primeru zaprtja oziroma drugih neželenih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom;
- jemljete varfarin (sredstvo za redčenje krvi);
- imate prenizko telesno maso (indeks telesne mase (ITM) < 18,5);
- ste noseči ali dojite;
- ni primerno za dojenčke ali malčke;
- otroci in mladostniki naj Obesimed® Max Forte uporabljajo le po posvetu z zdravnikom.



CE 0481

Izd. št.: 073606

 **Proizvajalec:**
PK Benelux BV,
Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL

Proizvedno na Nizozemskem.

Zastopnik za Slovenijo:
DIFAR d.o.o.,
Pernetova ulica 1,
1236 Trzin, 01-564-11-95
www.difar.si

Zmanjša vnos kalorij iz maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov


Zmanjša apetit

Za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti

Znanstveno dokazani učinki

 Medicinski pripomoček CE 0481

ZMANJŠA
**OMTEC®
XS/50**
VNOS KALORIJ



30 tablet

24085

VE13500-1V

LOT



073606D-V1.2.