

# GLUE AREA ZONE

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

## Uporaba / Upotreba

Novalac AR je hrana, posebej razvita za zadovoljavanje prehranskih zahtev dojenčkov z regurgitacijo. Novalac AR je primeren za dojenčke in majhne otroke od rojstva do 36. meseca starosti, če jih matere ne doijo. Po 6. mesecu starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Novalac AR po nasvetu zdravnika uporabljate kot del raznovrstne prehrane. Novalac AR je zoščena formula, posebej namenjena dojenčkom z regurgitacijo in težavami z gastroezofagealnim refluksom. Novalac AR vsebuje skrob, ki zmanjšuje regurgitacijo. Novalac AR je hrana, posebno razvijena za zadovoljavanje prehranbenih potreba dojenčadi s regurgitacijom. Novalac AR primjeren je za dojenčka i malu djecu od rođenja do 36. mjeseca starosti, ako majka ne doji. Novalac AR zadovoljava sve prehranbe potrebe dojenčadi do 6. mjeseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 mjeseci prema prepovicu lječnika dio je raznolike prehrane. Novalac AR je zgusnjuta formula posebno namenjena dojenčadi s regurgitacijom i poteškoćama z gastroezofagealnim refluksom. Novalac AR sadrži skrob koji smanjuje regurgitaciju.

## Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Novalac AR uporabljaljajo samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih, ki imajo simptome, za katere je živilo namenjeno. Proizvod ne smete uporabljati kot edini vir hrane po 6. mesetu starosti. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z slabljenim imunskim odzivom, nedonošenčki ali novorjenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Proizvod ni primeren za parenteralno uporabo ali za hranjenje po sondu. Pakirano v kontrolirani atmosferi. Majčino mlejko najboljje je hrana za dojenčad. Novalac AR se mora uživati pod lječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi koda pokazuje simptome kojima je proizvod namenjen. Proizvod nije primeren za užimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. meseta starosti. Poseban opred je potreban i kod dojenčadi z slabljenim imunitetom, nedonošenčadi ili novorođenčadi niske porodne težine te kod alergijskih reakcij na mliječne beljakovine. Nepravilna priprava ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravju. Proizvod nije primeren za parenteralnu uporabo. Novalac AR nije prikladan za hranjenje putem sonde. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

## Odmjerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (meseči) / Starost dojenčeta (meseči)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Število obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4	3*	2*
Število meric za pripravo enega obroka/	3	4	5	7	7	8
Broj mjerica za pripremu jednog obroka						
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210	210	240

\*Kot del raznolike prehrane / Kao dio raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do robja povravljana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca AR. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkov starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočili v tabeli. Do vrha napolnjena i do ruba povravljana priložena merica sadržava 4,3 g Novalaca AR. Jednu mjericu raztopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako Vam lječnik nije drugače svetovalo, držite se priporoček u tablici.

- Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščitenem pred svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do dатuma, odtisnjene na dnu pličevinke. • Po prvem odprtju pličevinke, morate vsebine porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pličevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepotpitega obroka. Ostanek zavriti. / Unitek pripremiti sveži obrok. • Čuvajte na suhom mestu, zaščiteni od svjetla i topline. • Proizvod je najbolje uporabljati do datuma otišnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj uporabite u roku od 3 jedrnatih. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepotpiten obrok. Ostatak bacite.

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švicarska • Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana / Sedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb

15FOM16A 30141203



3 831061 011325

ME

DIS | www.novalac.si  
www.novalac.hr

# Novalac AR

## Živilo za posebne zdravstvene namene

### Za prehransko uravnavanje regurgitacije pri dojenčkih

Hrana za posebne  
medicinske potrebe  
Za dijetalnu prehranu dojenčadi  
s regurgitacijom



0-36 mesecev/  
mjeseci

400g e

## Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
<b>Energijska vrednost/</b>	kJ 2114	275
<b>Energetska vrijednost</b>	kcal 505	66
<b>Maslove / Masti</b>	g 25	3,3
- od tega nasičene maščobe /		
- od kajih zasičene masne kiseline	g 11,6	1,5
- linolna kislina / linolna kiselina	g 4,5	0,6
- alfa linolenska kislina / alfa linolenska kiselina /	mg 405	53
dokozahexaenska kiselina /	mg 120	16
- ARA (arachidonska kislina / arachidonska kiselina)	mg 30	4
<b>Ogljikovi hidrati / Uglikohidrati</b>	mg 59,4	7,7
- od tega sladkorji / od kajih šečeri	g 43,4	5,6
- od tega škrob / od kajih škrob	g 16	2,1
<b>Beljakovine / Beljančevine</b>	g 10,4	1,4
<b>Sol</b>	g 0,413	0,05
<b>Vitamini</b>		
A	ug 440	57
D	ug 11,5	1,5
E	ug 8,7	1,1
K	ug 60	7,8
C	mg 65	8,5
Tiamin	mg 0,8	0,10
Riboflavin	mg 1,2	0,2
Niacin	mg 4,5	0,6
B6	mg 0,5	0,07
Folna kislina / Folna kiselina	ug 85	11
Folat	ug-DFFE 155	20
B12	ug 1,5	0,2
Biotin	ug 18	2,3
Pantotska kislina / Pantotska kiselina	mg 5	0,7
<b>Minerali</b>		
Natrij	mg 165	21
Kalij	mg 580	75
Klorid	mg 385	50
Kalcij	mg 460	60
Fosfor	mg 335	44
Magnezij	mg 45	5,9
Železo / Željezo	mg 5	0,7
Cink	mg 3,9	0,5
Baker / Bakar	mg 0,38	0,05
Mangan	mg 0,035	0,005
Fluorid	ug <0,45	<0,06
Selen	ug 22	2,9
Krom	ug <45	<5,9
Molibden	ug <45	<5,9
Jod	ug 95	12
Holin / Kolin	mg 170	22
Inozitol	mg 80	10,4
Tavrin / Taurin	mg 40	5,2
L-karnitin	mg 20	2,6

## Sestavine / Sastojci

Poneito mleko, laktosa, rastlinska olja (palmino, sojno, kokosovo), koruzni skrob, ribje olje (DHA) (mleko), holin bitartrat, emulzija (sojin lecitin), trikalijev citrat, vitamini (natrijev asparbat, DL-alfa-tokoferol acetat, kalijev acetat, retinil acetat, pirodoksantriol, arachidonska kiselina, fitomenadion, holoferiferol, D-biotin, clankobalmin), inozitol, L-cistin, kalijev klorid, olje iz glive Mortierella alpina (ARA) (mleko), trikalijev fosfat, natrijev sulfat, trikalijev citrat, antoksidanti (izvezek bogat s tokoferojem), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat. / Obrano mlijeko, laktosa, biljna ulja (palmino, sojno, kokosovo), kurkumini skrob, ribjje ulje (DHA) (mleko), kolin bitartrat, emulgator (sojin lecitin), trikalijev citrat, vitaminii (natrijev askorbat, DL-alfa-tokoferol acetat, kalijev D-pantotenat, nikotinamat, arachidonska kiselina, tiamin-hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, pirodoksin-hidroklorid, folna kiselina, fitomenadion, kolekferol, D-biotin, cijanokobalmin), inozitol, L-cistin, kalijev klorid, L-triptofan, kalijev klorid, ulje glive Mortierella alpina (ARA) (mleko), trikalijev fosfat, natrijev sulfat, željezni sulfat, L-karnitin, magnezijev oksid, cinkov sulfat, trikalijev citrat, antoksidansi (izvezek bogat s tokoferojem), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

## Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA  
SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME  
SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.

- 1 Stekljeničko in pokrovček z dušo prekuhanje v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dušom prekuhanje u vodi. Neka ključa bar 5 minut.
- 2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prekuhanje u pokrivenom lončku. Neka ključa bar 5 minut.
- 3 Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelijite v stekljeničko. / Vodu v lončku ohladite na 40 °C in prelijite je u bočicu.
- 4 V stekljeničko s priloženo merico usvite predpisano število meric. / Uspite v bočicu propisani broj mjerica pomoču priložene merice.
- 5 Stekljeničko zaprite in dobro pretresite da se pršek popolnoma raztoplji. / Bočicu zatvorite in dobro promučkajte da se pršak potpuno otopi.
- 6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne cutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlačnog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

M - Tin size 400g 99x123,5 - Offset Label size 323,8x115