

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Uporaba/Upotreba

Novalac IT je hrana, posebej razvita za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov z zaprtjem, upočasnjenim gibanjem črevesja in trdim blatom. Novalac IT je primeren za dojenčke in majhne otroke od rojstva do 36. meseca starosti, če jih matere ne dojijo. Do 6. meseca starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Novalac IT po nasvetu zdravnika uporabljate kot del raznovrstne prehrane. Novalac IT ima posebno sestavo, minerale in ogljikove hidrate (samo laktozo), ki spodbujajo gibanje črevesja. Novalac IT je po nasvetu zdravnika priporočljivo vpeljati postopoma: 1.dan: vsaka druga steklenička; 2.dan: vsaka steklenička. / Novalac IT je hrana, posebno razvijena za zadovoljevanje prehrabnih potreb dojenčadi sa zatvorom, usporenim pokretima crijeva i tvrdom stolicom. Novalac IT primjeren je za dojenčad i malu djecu od rođenja do 36. mjeseca starosti, ako majka ne doji. Novalac IT zadovoljava sve prehrabne potrebe dojenčadi do 6. mjeseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 mjeseci prema preporuci liječnika dio je raznolike prehrane. Novalac IT ima posebni sastav, minerale i ugljikohidrate (samo laktozu), koji potiču pokret crijeva. Novalac IT je prema savjetu liječnika preporučljivo uvesti postupno: 1.dan:svaka druga bočica; 2.dan:svaka bočica.

Pomembno opozorilo/Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Novalac IT uporabljajte samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih, ki imajo simptome, za katere je živilo namenjeno. Proizvoda ne smete uporabljati kot edini viš hrane po 6. mesecu starosti. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z oslabljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Proizvod ni primeren za parenteralno uporabo ali za hranjenje po sondi. Pakirano v kontrolirani atmosferi. / Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Novalac IT se mora uzimati pod liječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi koja pokazuju simptome kojima je proizvod namijenjen. Proizvod nije primjeren za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. mjeseca starosti. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Proizvod nije primjeren za parenteralnu uporabu. Novalac IT nije prikladan za hranjenje putem sonde. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Odmerjanje/Doziranje

Starost dojenčka (mesece) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Število obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4	3*	2*
Število meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7	7	8
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210	210	240

*Kot del raznolike prehrane / Kao dio raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca IT. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca IT. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako Vam liječnik nije drugačije savjetovao, držite se preporuke u tablici.

• Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, oddisnega na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepoptote obroka. Ostanek zavrite. • Uvijek pripravite sveži obrok. • Čuvajte na suhim mestu, zaščiteno od svetla i topline. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma oisnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatok bacite.

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica • Distributer: Medis, d.o.o., Bmčičeva 1, Ljubljana / Sedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska • Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb, Kontakt za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Broj i datum izjave u FBiH. Broj izjave u opisu u Registar RS. Proizvedeno u EU/Proizvedeno u EU.

MEDIS | www.novalac.si
www.novalac.hr
www.novalac.ba



0-36 mesecev/
mjeseci

400g e

Novalac IT

Živilo za posebne zdravstvene namene
Za prehransko uravnavanje
zaprtja pri dojenčkih

Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu prehrano dojenčadi
sa zatvorom



Hranilna vrednost/Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost/Energetska vrijednost	KJ	2121 276
	kcal	506 66
Maščobe/Masti	g	25 3,3
- od tega nasičene maščobe/ od kojih zasičene masne kiseline	g	11,7 1,5
- linolna kislina/linolna kiselina	g	4,5 0,6
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	405 53
- DHA (dokosaheksaenska kislina/ dokosaheksaenska kiselina)	mg	120 16
- ARA (arahidonska kislina/arahidonska kiselina)	mg	30 4
Ogljikovi hidrati/Ugljikohidrati	g	59,4 7,7
- od tega sladkorji/od kojih sečeri	g	59,4 7,7
Beljakovine/Bjelancevine	g	10,4 1,4
Sol	g	0,438 0,06
Vitamini		
A	µg	440 57
D	µg	12 1,6
E	mg	8,7 1,1
K	µg	60 7,8
C	mg	60 7,8
Tiamin	mg	0,8 0,10
Riboflavin	mg	1,3 0,2
Niacin	mg	4,5 0,6
B6	mg	0,5 0,07
Folna kislina/Folna kiselina	µg	80 10
Folat	µg-DFE	140 18
B12	µg	1,8 0,2
Biotin	µg	18 2,3
Pantotenska kislina/Pantotenska kiselina	mg	5 0,7
Minerali		
Natrij	mg	175 23
Kalij	mg	540 70
Klorid	mg	390 51
Kalcij	mg	515 67
Fosfor	mg	270 35
Magnezij	mg	65 8,5
Železo/Željezo	mg	5,1 0,7
Cink	mg	3,5 0,5
Baker/Bakar	mg	0,39 0,05
Mangan	mg	0,045 0,006
Fluorid	mg	<0,45 <0,06
Selen	µg	26 3,4
Krom	µg	<45 <5,9
Molibden	µg	<45 <5,9
Jod	µg	95 12
Holin/Kolin	mg	170 22
Inozitol	mg	80 10,4
Taurin/Taurin	mg	40 5,2
L-karnitin	mg	20 2,6

Sestavine/Sastojci

Posneto mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palmove, spino, kokosovo), laktoza, trikalcijev citrat, ribje olje (DHA) (mleko), trikalcijev citrat, emulgator (sojin lecitin), kalcijev klorid, kalijev klorid, trikalcijev fosfat, holin bitartrat, dihidrijev fosfat, L-tirozin, vitamin (natrijev askorbat, DL-alfa-tokofolil acetat, kalcijev D-pantotemat, nikotinamid, tiaminjev hidroklorid, retinil acetat, piroksingjev hidroklorid, riboflavin, askorbinska kislina, folna kislina, fitomenadion, kolekalciferol, D-biotin, cianokobalamin), L-fenilalanin, natrijev klorid, magnezijev oksid, inozitol, olje iz oljve Mortierella alpina (ARA) (mleko), taurin, L-tryptofan, železov fosfat, L-karnitin, cinkov sulfat, natrijev selenit, antioksidanti (izvleček bogat tokoferoli), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat. / Obično mlijeko, mliječne bjelancevine, biljna ulja (palmino, spino, kokosovo), laktoza, trikalcijev citrat, ribje ulje (DHA) (mlijeko), trikalcijev citrat, emulgator (sojin lecitin), kalcijev klorid, kalijev klorid, trikalcijev fosfat, kolin bitartrat, dinatrijev fosfat, L-tirozin, vitamini (natrijev askorbat, DL-alfa-tokofolil acetat, kalcijev D-pantotemat, nikotinamid, tiamin-hidroklorid, retinil acetat, piroksidin-hidroklorid, riboflavin, askorbinska kiselina, folna kiselina, fitomenadion, kolekalciferol, D-biotin, cijanokobalamin), L-fenilalanin, natrijev klorid, magnezijev oksid, inozitol, ulje gljive Mortierella alpina (ARA) (mlijeko), taurin, L-tryptofan, željezo fosfat, L-karnitin, cinkov sulfat, natrijev selenit, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Navodila za pripravo/Uputa za pripremu

PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMITE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.

1 Stekleničko in pokrovček z dudno prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.

2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.

3 Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelijte je u bočicu.

4 V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.

5 Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.

6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C) oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

M - Tin size 250/400g 99x123,5 - Offset Label size 323,8x115

4 Colors: ■ Cut

■ Magenta

■ Yellow

■ Pantone 288

■ Pantone 2592