



1%

Za nanošenje gela u parodontalne džepove koristi se posebna igla sa kapilarom. U slučaju osjetljivosti posavjetujte se kod svojeg stomatologa.



OPIS DJELOVANJA

Parodontalni gel CURASEPT® 1% za lokalnu terapiju djeluje na odabранo područje i ne stvara bolova.

Kopolimer PVP/VA, kojeg sadrži gel, stvara zaštitni film na desnim, koji su mehanskim djelovanjem doprinosi ka olakšanju simptoma nadraživanje usne sluznice. Taj mehanizam isto tako snižava nastajanje i nakupljanje zubnih naslaga.

Sadrži 1 % klorheksidinijevog diglukonata, koji pruža učinkovito antiseptičko djelovanje. Oval proizvod ne sadrži alkohol, koji može stvarati nadraživanje i bol, te zbog dodanog sistema A.D.S® osigurava visoki stepen prihvatljivosti.

A.D.S. Anti Discoloration System®

Poslijedica dugotrajne uporabe proizvoda koji sadrže klorheksidin može obojati zube. Sustav A.D.S.® u CURASEPT® proizvodima inhibira dva glavna mehanizma koja uzrokuju zabojenje te smanjuje učestalost i opseg obojenja.

INDIKACIJE

Lokalna terapija pomaže ublažavanju boli desni tijekom Zubnog liječenja, prikladna je za korisnike proteza, ortodontskih aparatova, kod stavljanja zubnih implantata i za one koji liječe parodontnu bolest. Sprječava nastajanje i nakupljanje zubnih naslaga.



NAČIN UPORABE

S vrhom prsta ili sa vrlo mekanom četkicom za zube

CURASEPT® primjenite gel na desni i masirajte.

Za primjenu gela u interdentalne prostore koristite interdentalnu četkicu CURASEPT®.

Kod osoba s parodontnom bolesću preporučuje se primjena u područje parodontognog džepa.



UPOZORENJE

Čuvati izvan dohvata djece. Ne gutati. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti napisanog na ambalaži ili u slučaju oštećene ambalaže.

Čuvati na sobnoj temperaturi. Pakiranje i njegov sadržaj odložite pažljivo i na odgovarajući način preostali sadržaj. Operite ruke prije i nakon upotrebe.

SADRŽAJ

30 ml tuba e

SUSTAV

Pročišćena voda, propilen glikol, hidroksietil celuloza, kopolimer PVP / VA, hidrogenirani PEG-40, ricinusovo ulje, klorheksidin diglukonat, natrij acetat, aroma, octena kiselina, natrij metabisulfit, askorbinska kiselina.

Vlasnik patenta: CURASEPT ADS s.r.l.

Proizvođač:

Curasept S.p.A. Via Parini, 19, 21047 Saronno (VA) - IT
Tel.: +39 02.9622799
WWW.CURASEPTSPA.COM

HR-distributer:
Vivit Pharma d.o.o.,
Savska cesta 41, 10000 Zagreb

Hrvatski prijevod:

VIVIT Pharma, d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb,

Zadnja revizija teksta: 7. 8. 2022

Medicinski proizvod. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za uporabu.



07/08/2022
0373



1%

Za nanos gela v parodontalne žepke uporabite posebno iglo s kapilarno cevko. V primeru občutljivosti se posvetujte z zobozdravnikom.



OPIS DELOVANJA

Parodontalni gel CURASEPT® 1% za lokalno terapijo učinkuje na izbrano območje in ne povzroča bolečin.

Kopolimer PVP/VA, ki ga vsebuje gel, tvori zaščitni film na dlesnih, ki z mehanskim delovanjem pripomore k lajšanju simptomov razdražene ustne sluznice. Isti mehanizem tudi zavira nastanek in nabiranje zobnih oblog.

Vsebuje 1 % klorheksidinovega diglukonata, ki zagotavlja učinkovito antisepetično delovanje. Ker ne vsebuje alkohola, ki bi lahko povzročil draženje in bolečino, ter zaradi dodanega sistema A.D.S.® ta izdelek dosega visoko stopnjo sprejemljivosti.

A.D.S. Anti Discoloration System®

Posledica daljše uporabe izdelkov, ki vsebujejo klorheksidin, je lahko zabarvanje zob. Sistem A.D.S.® v izdelkih CURASEPT® zavira dva glavna mehanizma, ki povzročata zabarvanje in zmanjšuje pojavnost in obseg zabarvanja.

INDIKACIJE

Lokalna terapija pripomore k lajšanju bolečin dlesni med zdravljenjem zob, primerna je za uporabnike zobnih protez, ortodontskih aparatov, zobnih vsadkov in za tiste, ki se spoprijemajo s parodontalnimi obolenji. Preprečuje nastanek in nabiranje zobnih oblog.



NAVODILO ZA UPORABO

S konico prsta ali z zelo mehko zobno ščetko CURASEPT® nanesite gel na dlesni in ga vmasirajte.

Za nanos v medzobne prostore uporabite medzobno ščetko CURASEPT®, pomočeno v gel. Pri osebah s parodontalnim obolenjem je priporočljiv nanos v območje parodontalnega žepka.



OPOZORILO

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne požirajte. Ne uporabljajte po preteku roka uporabe zapisanega na embalaži, oziroma če je embalaža poškodovana. Shranjujte pri sobni temperaturi. Previdno in ustrezno zavrzite embalažo in njeno preostalo vsebino. Pred uporabo in po njej si umijte roke.

VSEBINA

30 ml tuba e

SESTAVINE

Prečiščena voda, propilen glikol, hidroksietil celuloza, kopolimer PVP/VA, PEG-40 hidrogenerano ricinusovo olje, klorheksidin diglukonat, natrijev acetat, aroma, ocetna kislina, natrijev metabolisulfit, askorbinska kislina.

Lastnik patentu: CURASEPT ADS s.r.l.

Proizvajalec: Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - SARONNO (VA) IT
Ph. + 39 02.9622799

WWW.CURASEPTSPA.COM

SI-uvodnik: VIVIT Pharma, d.o.o.,
Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Slovenija

Slovenski prevod:

VIVIT Pharma, d.o.o.,
Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Zadnja revizija teksta: 7. 8. 2022

Medičinski pripomoček. Pred uporabo natanko preberite navodila za uporabo.



07/08/2022
0373