

Salvit GastriCon

meke kapsule / soft capsules / mehke kapsule / kapsula tã buta

HR/BiH

Upute za uporabu medicinskog proizvoda

- Prije uporabe medicinskog proizvoda pažljivo pročitajte upute.
- Sačuvajte ove upute za uporabu, možda ćete ih trebati ponovno pročitati.
- Ako se simptomi pogoršaju i nema poboljšanja, posjetite Vašeg liječnika.

Sadržaj:

1. Što je medicinski proizvod Salvit GastriCon i za što se upotrebljava?
2. Salvit GastriCon – upute za uporabu
3. Kontraindikacije
4. Mjere opreza i upozorenja
5. Moguće nuspojave
6. Sigurnost korištenja
7. Salvit GastriCon uvjeti skladištenja
8. Ostale informacije

Jedna meka kapsula Salvit GastriCon sadržava:

240 mg simetikona
Pomoćne tvari: želatina, glicerol, kinolin žuta

1. Što je Salvit GastriCon medicinski proizvod i za što se upotrebljava?

Salvit GastriCon sadržava simetikon u visokoj dozi. Time se povećava učinkovitost pripravka, što pridonosi učinkovitijem ublažavanju tegoba uzrokovanih jakim nadimanjem.

Simetikon je stabilna smjesa silikonskog polimera i silicijeva dioksida sa svojstvima protiv pjenjenja i adsorbiranja intestinalnih plinova. Preporučena doza simetikona ima samo površinski učinak i neutralan je za tijelo. Simetikon se ne apsorbira iz probavnog trakta, ne mijenja pH vrijednost želučanog sadržaja, ne mijenja probavne procese i ne interferira s mehanizmima apsorpcije u crijevima. Izlučuje se iz tijela u nepromijenjenom obliku. Simetikon ima sposobnost smanjenja površinske napetosti crijevne sluzi i mjehurića plina u crijevima. Na taj način olakšava njihovo pucanje i rastvaranje što olakšava uklanjanje suvišnih plinova nakupljenih u probavnom traktu.

Salvit GastriCon upotrebljava se za ublažavanje simptoma povezanih s prekomjernim nakupljanjem plinova u želucu i crijevima, koji su posljedica crijevne fermentacije tijekom probavnih procesa. To uključuje: osjećaj sitosti, jaku nadutost, podrigivanje, što može biti posljedica, između ostalog, pogrešne prehrane.

Salvit GastriCon također se upotrebljava kao pomoćno sredstvo prije dijagnostičkog pregleda unutar trbušne šupljine pomoću tehnika kao što su radiografija, ultrazvuk i endoskopija. Pomaže u uklanjanju plinova i zraka iz probavnog trakta, čime se poboljšava kvaliteta dobivenih snimki i eliminiraju dijagnostičke poteškoće.

2. Salvit GastriCon – upute za uporabu

Medicinski proizvod Salvit GastriCon u obliku želatinskih kapsula se uzima oralno.

Simptomi prekomjernog nakupljanja plinova u crijevima, kao što su plinovi, nadutost, osjećaj sitosti, podrigivanje
Osobe starije od 18 godina: 2 – 3 kapsule na dan.

Priprema za dijagnostičke preglede trbušne šupljine

Dan prije pregleda: 1 kapsula navečer; na dan pregleda: 1 kapsula ujutro na prazan želudac. Kapsule se mogu uzimati prije, poslije i tijekom obroka s odgovarajućom količinom tekućine (otprilike 1 čaša vode).

Ako se propusti doza, ne smije se primijeniti dvostruka doza kako bi se nadoknadila zaboravljena doza. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Proizvod nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

3. Kontraindikacije

Proizvod Salvit GastriCon ne smije se upotrebljavati u slučaju preosjetljivosti na simetikon ili neki drugi sastojak proizvoda.

4. Mjere opreza i upozorenja

Primjena proizvoda tijekom trudnoće i dojenja zahtijeva konzultaciju s liječnikom.

Ako postojeći simptomi potraju ili se pogoršaju te se pojave novi gastrointestinalni simptomi, preporučuje se konzultacija s liječnikom kako bi se utvrdio uzrok i započelo liječenje.

Nije bilo klinički značajnih interakcija simetikona, međutim, zbog vjerojatnosti interakcija s lijekovima, ne preporučuje se istodobno uzimanje medicinskog proizvoda Salvit GastriCon s drugim lijekovima.

5. Moguće nuspojave

Nisu prijavljene nikakve značajne nuspojave povezane s upotrebom simetikona. Povremeno, neki pacijenti mogu osjetiti bolove u trbuhu, proljev i konstipaciju.

Ako primijetite bilo kakvu nuspojavu povezanu s upotrebom ovoga medicinskog proizvoda, prijavite ih proizvođaču.

6. Sigurnost korištenja

Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti nalazi se u europskoj bazi podataka o medicinskim proizvodima (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda (UDI-DI):

- 15 kapsula: 5904055002871
- 30 kapsula: 5904055002918







Svaki ozbiljan incident koji uključuje medicinski proizvod treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu relevantne države članice u kojoj pacijent boravi.

7. Salvit GastriCon uvjeti skladištenja

Čuvati u originalnom pakiranju, na sobnoj temperaturi (15-25 °C), izvan pogleda i dohvata djece.

8. Ostale informacije

Medicinski proizvod Salvit GastriCon dostupan je u pakiranju od 15, 30 mekih kapsula.

	Pogledajte upute za uporabu		Medicinski proizvod
	LOT broj		Temperatura skladištenja
	Upotrijebiti prije		Proizvođač

 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland

Informacije o medicinskom proizvodu:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland
www.hasco-lek.pl, tel.: +48 22 742 00 22

Distributer za Republiku Hrvatsku:

Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvatska,
Tel: +385 (0)49 / 326 550
E-mail: info@salvushealth.com, Web: www.salvushealth.com

Uvoznici i distributeri za BiH:

HERCEGOVINALIJEK d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Tel: +387 36 501 500
Oktal Pharma d.o.o., Sarajevo Pijačna 14a, 71210 Sarajevo, Tel: +387 33 777 280
Farmis d.o.o., Igmanska bb, 71320 Vogošća

Datum izrade Uputa za uporabu: Lipanj 2022



EN

Instruction for use of the medical device

- Please read the instructions carefully before using the medical device.
- Keep this manual, you may need to read it again.
- If symptoms worsen and there is no improvement, see your doctor.

Table of contents:

1. What is Salvit GastriCon medical device and what it is used for?
2. Salvit GastriCon - instructions of use
3. Contraindications
4. Precautions and warnings
5. Potential side effects
6. Safety of use
7. Salvit GastriCon storage conditions
8. Other information

1 soft capsule of Salvit GastriCon medical device contains:

240 mg of simethicone
Excipients: gelatine, glycerol, quinoline yellow

1. What is Salvit GastriCon medical device and what it is used for?

Salvit GastriCon contains simethicone in a high dose. As a result, the effectiveness of the preparation is increased, which contributes to more effective alleviation of ailments caused by strong flatulence.

Simethicone is a stable mixture of silicone polymer and silicon dioxide with defoaming and intestinal gas adsorbing properties. The recommended dose of simethicone has only a superficial effect and is indifferent to the body. Simethicone is not absorbed from the gastrointestinal tract, does not change the pH of the digestive content, does not change the digestive processes and does not interfere

with the intestinal absorption mechanisms. It is excreted from the body unchanged. Simethicone has the ability to reduce the surface tension of mucus and gas bubbles in the intestines. In this way, it facilitates their cracking and breaking, which facilitates the removal of excess gas accumulated in the digestive tract.

Salvit GastriCon is used to relieve symptoms associated with excessive accumulation of gases in the stomach and intestines, resulting from intestinal fermentation during digestive processes. These include: a feeling of fullness, severe bloating, belching, which may be the result of, among others, dietary mistakes.

Salvit GastriCon is also used as an auxiliary before performing diagnostic examinations within the abdominal cavity using imaging techniques, such as: radiography, ultrasound and endoscopy. It helps to remove gases and air from the gastrointestinal tract, thus improving the quality of the obtained images and eliminating diagnostic difficulties.

2. Salvit GastriCon – instructions of use

Medical device Salvit GastriCon in the form of gelatine capsules is used orally.

Symptoms of an excessive build-up of gas in the gut, such as gas, bloating, feeling full, belching
People over 18 years of age: 2-3 capsules a day.

Preparation for diagnostic tests in the abdominal cavity

On the day preceding the examination: 1 capsule in the evening; on the day of examination: 1 capsule in the morning, on an empty stomach. The capsules can be taken before, after and during meals with a sufficient amount of liquid (about 1 glass of water).

If a dose is missed, a double dose should not be administered to make up for the forgotten dose.

Do not exceed the recommended dose.

Do not use the product after the expiry date.

3. Contraindications

The product Salvit GastriCon should not be used in the case of hypersensitivity to simethicone or any other component of the product.

4. Precautions and warnings

The use of the product during pregnancy and breastfeeding requires medical consultation.

If the existing symptoms persist or worsen and new gastrointestinal symptoms occur, a medical consultation is recommended to determine the cause and initiate treatment.

There were no clinically significant drug interactions of simethicone, however, due to the likelihood of drug interactions, it is not recommended to use the medical device Salvit GastriCon simultaneously with drugs.

5. Potential side effects

There have been no reports of significant undesirable effects related to the use of simethicon. Occasionally, some patients may experience abdominal pain, diarrhoea, constipation.

If you experience any side effects related to the use of a medical device, report them to the manufacturer.

6. Safety of use

Summary of safety and clinical efficacy available is in the European database on medical devices (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Unique identification code of the product (UDI-DI):

- 15 capsules: 5904055002871
- 30 capsules: 5904055002918







Any serious incident involving a medical device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the relevant Member State in which the patient resides.

7. Salvit GastriCon storage conditions

Store in the original package, at room temperature (15-25 °C), out of the sight and reach of children.

8. Other information

Medical device Salvit GastriCon is available in a pack of 15, 30 soft capsules.

	Consult instructions for use		Medical device
	LOT number		Storage temperature
	Use before		Manufacturer

 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland

Medical device information:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland
www.hasco-lek.pl, tel.: +48 22 742 00 22

Date of the preparation of Instructions for use: June 2022



RS

Uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva

- Molimo vas da pročitate uputstvo pažljivo pre upotrebe ovog medicinskog uređaja.
- Sačuvajte ovaj priručnik, možda će vam biti potrebno da ga pročitate ponovo.
- Ako se simptomi pogoršaju ili nema poboljšanja, posetite svog lekara.

Sadržaj:

1. Šta je medicinsko sredstvo Salvit GastriCon i za šta se koristi?
2. Salvit GastriCon – uputstvo za upotrebu
3. Kontraindikacije
4. Predostrožnosti i upozorenja
5. Potencijalni neželjeni efekti
6. Bezbednost upotrebe
7. Salvit GastriCon uslovi za skladištenje
8. Ostale informacije

1 meka kapsula medicinskog sredstva Salvit GastriCon sadrži:

240 mg simetikona
Pomoćne supstance: želatin, glicerol, kinolin žuta

1. Šta je medicinsko sredstvo Salvit GastriCon i za šta se koristi?

Salvit GastriCon sadrži simetikon u visokoj dozi. Kao rezultat, povećava se efikasnost preparata, što doprinosi efikasnijem ublažavanju tegoba izazvanih jakim nadimanjem.

Simetikon je stabilna mešavina silikonskog polimera i silicijem dioksida sa svojstvima protiv pene i adsorbovanja gasova u crevima. Preporučena doza simetikona ima samo površno dejstvo i ne utiče na telo. Simetikon se ne apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta, ne menja pH digestivnog sadržaja, ne menja procese varenja i ne ometa mehanizme crevne apsorpcije. Izlučuje se iz tela u nepromenjenom obliku. Simetikon ima sposobnost da smanji površinski napon sluzi i mehurića gasa u crevima. Na taj način olakšava njihovo pucanje i lomljenje, što olakšava uklanjanje viška gasova nakupljenih u digestivnom traktu.

Salvit GastriCon se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa prekomernim nakupljanjem gasova u želucu i crevima, koji su rezultat crevne fermentacije tokom procesa varenja. To uključuje: osećaj sitosti, jako nadimanje, podrigivanje, što može biti rezultat, između ostalog, grešaka u ishrani.

Salvit GastriCon se koristi i kao pomoćno sredstvo pre obavljanja dijagnostičkih pregleda u okviru trbušne duplje pomoću tehnika pravljenja slika, kao što su: radiografija, ultrazvuk i endoskopija. Pomaže u uklanjanju gasova i vazduha iz gastrointestinalnog trakta, čime se poboljšava kvalitet dobijenih slika i eliminišu dijagnostičke poteškoće.

2. Salvit GastriCon – uputstvo za upotrebu

Medicinsko sredstvo Salvit GastriCon u obliku želatinskih kapsula koristi se oralno.

Simptomi prekomernog nakupljanja gasova u crevima, kao što su gasovi, nadimanje, osećaj sitosti, podrigivanje
Osobe starije od 18 godina: 2-3 kapsule dnevno.

Priprema za dijagnostičke testove u trbušnoj duplji

Na dan pre pregleda: 1 kapsula uveče; na dan pregleda: 1 kapsula ujutru na prazan stomak.

Kapsule se mogu uzimati pre, posle ili tokom obroka sa dovoljnom količinom tečnosti (otprilike 1 čaša vode).

Ako se doza preskoči, dupla doza se ne sme uzimati radi nadomešćenja zaboravljene doze.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Nemojte koristiti proizvod kome je istekao rok.

3. Kontraindikacije

Proizvod Salvit GastriCon ne treba koristiti u slučaju hipersenzitivnosti na simetikon ili bilo koju drugu komponentu proizvoda.

4. Preostoznostsi i upozorenja

Upotreba ovog proizvoda tokom trudnoce i dojenja zahteva lekarsku konsultaciju. Ako postojeći simptomi potraju ili se pogorsaju i pojave se novi gastrointestinalni simptomi, preporucuje se medicinska konsultacija kako bi se utvrdio uzrok i zapocelo lecenje.

Nije bilo klinički značajnih interakcija simetikonu sa lekovima, međutim, zbog verovatnoće interakcije sa lekovima, ne preporucuje se upotreba medicinskog sredstva Salvit Gastricon istovremeno sa lekovima.

5. Potencijalni neželjeni efekti

Nije bilo izveštaja o značajnim neželjenim efektima u vezi sa upotrebom simetikonu. Povremeno, neki pacijenti mogu iskusiti bol u stomaku, dijareju i zatvor.

Ako osetite bilo kakve neželjene efekte u vezi sa upotrebom medicinskog sredstva, prijavite ih proizvođaču.

6. Bezbednost upotrebe

Rezime bezbednosti i kliničke efikasnosti dostupan je u evropskoj bazi podataka o medicinskim sredstvima (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda (UDI-DI):

- 15 kapsula: 5904055002871
- 30 kapsula: 5904055002918

Svaki ozbiljan incident koji uključuje medicinsko sredstvo treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu relevantne države članice u kojoj pacijent boravi.

7. Salvit Gastricon uslovi za skladištenje

Čuvajte proizvod u originalnom pakovanju, na sobnoj temperaturi (15-25°C), tako da ga deca ne mogu ni videti ni dohvatiti.

8. Ostale informacije

Medicinsko sredstvo Salvit Gastricon je dostupno u pakovanju od 15, 30 mekih kapsula.

	Konsultujte uputstvo za upotrebu		Medicinsko sredstvo
	Broj serije		Temperatura skladištenja
	Rok upotrebe		Proizvođač

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland

Informacije o medicinskom uređaju:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland
www.hasco-lek.pl, tel.: +48 22 742 00 22

Ovlašćeni predstavnik za RS:

Salvus International d.o.o., Dobanovska 56, 11080 Zemun,
Tel. +381 (0) 60 0774 491

Datum sastavljanja Uputstva za upotrebu: jun 2022.



SL0

Navodila za uporabo medicinskega pripomočka

- Pred uporabo medicinskega pripomočka natančno preberite navodila.
- Ta priročnik shranite, morda ga boste morali ponovno prebrati.
- Če se simptomi poslabšajo in ni izboljšanja, obiščite zdravnika.

Kazalo:

1. Kaj je medicinski pripomoček Salvit Gastricon in za kaj se uporablja?
2. Salvit Gastricon - navodila za uporabo
3. Kontraindikacije
4. Varnostni ukrepi in opozorila
5. Možni stranski učinki
6. Varna uporaba
7. Salvit Gastricon pogoji skladiščenja
8. Ostale informacije

1 mehka kapsula Salvit Gastricon medicinski pripomoček vsebuje:

240 mg simetikonu
Pomožne snovi: želatina, glicerol, kinolinsko rumeno

1. Kaj je Salvit Gastricon in za kaj se uporablja?

Salvit Gastricon vsebuje visok odmerek simetikonu. Rezultat tega je povečana učinkovitost pripravka, kar prispeva k učinkovitejšemu lajšanju tegob, ki jih povzročajo močno napenjanje.

Simetikon je stabilna mešanica silikonskega polimera in silicijevega dioksida z lastnostmi proti penjenju in adsorbiranju prebavnih plinov. Priporočeni odmerek simetikonu deluje le površinsko in je za telo indiferenten. Simetikon se ne absorbira iz prebavil, ne spremeni pH vrednosti vsebine prebavnega trakta, ne spremeni prebavnih procesov in ne moti mehanizmov črevesne absorpcije. Iz telesa se izloča nespremenjen. Simetikon ima sposobnost zmanjševanja površinske napetosti črevesne sluznice in zračnih mehurčkov v črevesju. Na ta način, olajša njihovo pokanje in razbijanje, kar olajša izločanje prekomernih plinov nakopičenih v prebavnem traktu.

Salvit Gastricon se uporablja za lajšanje simptomov, povezanih s prekomernim kopičenjem plinov v želodcu in črevesju, ki je posledica črevesne fermentacije med prebavnimi procesi. Sem spadajo: občutek polnosti, močno napenjanje, spahovanje, kar je lahko med drugim tudi posledica napačnih prehranskih navad.

Salvit Gastricon se dodatno uporablja tudi pred izvedbo diagnostičnih preiskav trebušne votline z uporabo slikovnih tehnik, kot na primer: radiografija, ultrazvok, endoskopija. Pomaga odstraniti plin in zračne mehurčke iz prebavil, s čemer se izboljša kakovost pridobljenih posnetkov in odpravi diagnostične težave.

2. Salvit Gastricon – navodila za uporabo

Medicinski pripomoček Salvit Gastricon v obliki želatinastih kapsul za oralno uporabo.

Simptomi prekomernega kopičenja plinov v črevesju, kot so vetrovi, napihnjenost, občutek polnosti, spahovanje

Osebe starejše od 18 let: 2-3 kapsule na dan.

Priprave na diagnostične preiskave trebušne votline

Dan pred preiskavo: 1 kapsula zvečer; na dan preiskave: 1 kapsula zjutraj, na prazen želodec.

Kapsule lahko jemljete pred, po in med obrokom z zadostno količino tekočine (približno 1 kozarec vode).

Če izpustite odmerek, ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljeni odmerek.

Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabe.

3. Kontraindikacije

Izdelek Salvit Gastricon se ne sme uporabljati v primeru preobčutljivosti na simetikon ali katero koli drugo sestavino izdelka.

4. Varnostni ukrepi in opozorila

Za uporabo izdelka med nosečnostjo in dojenjem se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Če obstoječi simptomi vztrajajo ali se poslabšajo in se pojavijo novi prebavni simptomi, se priporoča posvet z zdravnikom, da se ugotovi vzrok in začne zdravljenje.

Doslej ni bilo klinično pomembnih interakcij simetikonu z zdravili, vendar zaradi možnih interakcij ni priporočeno jemati medicinskega pripomočka Salvit Gastricon sočasno z zdravili.

5. Možni stranski učinki

Ni poročil o pomembnih neželjenih učinkih, povezanih z uporabo simetikonu. Občasno se lahko pri nekaterih bolnikih pojavijo bolečine v trebuhu, driska, zaprtje.

Če se pojavijo neželeni učinki, povezani z uporabo medicinskega pripomočka, te sporočite proizvajalcu.

6. Varna uporaba

Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti je na voljo v evropski centralni bazi medicinskih pripomočkov (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Identifikator pripomočka (UDI-DI):

- 15 kapsul: 5904055002871
- 30 kapsul: 5904055002918

Vsak resen incident, povezan z medicinskim pripomočkom, je potrebno prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu zadevne države članice, v kateri prebiva pacient.

7. Salvit Gastricon pogoji skladiščenja

Shranjujte v originalni ovojnini, pri sobni temperaturi (15-25°C), nedosegljivo otrokom.

8. Ostale informacije

Medicinski pripomoček Salvit Gastricon je na voljo v pakiranju po 15, 30 mehkih kapsul.

	Glejte navodila za uporabo		Medicinski pripomoček
	Številka serije		Omejitev temperature skladiščenja
	Uporabno do		Proizvajalec

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poljska

Informacije o medicinskem pripomočku:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poljska
www.hasco-lek.pl, tel.: +48 22 742 00 22

Distributer za Slovenijo:

SALVUS MED d.o.o., Jakšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 51 364 104
E-mail: infosalvusmed@salvushealth.com

Datum izdelave Navodil za uporabo: junij 2022



AL

Udhëzimet e përdorimit të pajisjes mjekësore

- Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet përpara se të përdorni këtë produkt.
- Ruajeni këtë manual, mund t'ju duhet ta lexoni përsëri.
- Nëse simptomat përkeqësohen dhe nuk ka përmirësime vizitoni mjekun tuaj.

Tabela e përmbajtjes:

1. Çfarë është Salvit Gastricon dhe për çfarë përdoret
2. Salvit Gastricon – udhëzime për përdorimin
3. Kundëriindikacionet
4. Masat paraprake dhe paralajmërimet
5. Efektet e mundshme anësore
6. Siguria e përdorimit
7. Kushtet e ruajtjes të Salvit Gastricon
8. Informacione të tjera

1 kapsulë e butë Salvit Gastricon përmban:

240 mg simetikon
Lëndët ndihmëse: xhelatinë, glicerinë, kinolinë e verdhë

1. Çfarë është Salvit Gastricon dhe për çfarë përdoret

Salvit Gastricon përmban simetikon në një dozë të lartë. Si rezultat efektiviteti i preparatit rritet, gjë që kontribuon në lehtësimin në efektiv të shqetësimeve të shkaktuara nga gurgullimat e zorrëve.

Simetikon është një përzjerje e qëndrueshme e polimerit të silikonit dhe dioksidit të silikonit me veti shkumëzuese dhe thithëse të gazrave të zorrëve. Doza e rekomanduar e simetikonit ka vetëm efekt lokal dhe nuk ka veprim të përgjithshëm në organizëm. Simetikonit nuk absorbohet nga trakti gastrointestinal, nuk ndryshon pH-në e përmbajtjes së zorrëve, nuk ndryshon proceset e tretjes dhe nuk ndërhyr në mekanizmat e përthithjes së zorrëve. Ai eliminohet nga trupi i pandryshuar. Simetikonit ka aftësinë të zvogëlojë tensionin sipërfaqësor të mukusit dhe fluskave të gazit në zorrët. Në këtë mënyrë lehtëson plasarjeten dhe thyerjen e tyre, gjë që lehtëson largimin e gazit të tepërt të grumbulluar në aparatit tretës.

Salvit Gastricon përdoret për të lehtësuar simptomat që lidhen me akumulimin e tepërt të gazrave në stomak dhe zorrë, si rezultat i fermentimit në zorrë gjatë proceseve të tretjes. Këto përfshijnë: ndjesinë e mbingopjes, fryrje të barkut, gulçime, që mund të jetë rezultat, ndër të tjera, nga gabimet në ushqyerje.

Salvit Gastricon përdoret edhe si ndihmës përpara kryerjes së ekzaminimeve diagnostikuese brenda zgavrës së barkut duke përdorur teknika imazherike si: radiografi, ultratinguj dhe endoskopi. Ndihej në largimin e gazrave dhe ajrit nga trakti gastrointestinal duke përmirësuar kështu cilësinë e imazheve të marra dhe duke eliminuar vështirësitë diagnostikuese.

2. Salvit Gastricon – udhëzime për përdorimin

Salvit Gastricon në formë kapsulash xhelatine administrohet nga goja.

Simptomat e një grumbullimi të tepërt të gazit në zorrë, të tilla si gazra, fryrje, ndjesi e mbingopjes, gulçime
Personat mbi 18 vjeç: 2-3 kapsula në ditë.

Përgatija për teste diagnostike në zgavrën e barkut

Ditën para ekzaminimit: 1 kapsulë në mëbrmje, ditën e ekzaminimit: 1 kapsulë në mëngjes me stomakun bosh.

Kapsulat mund të merren para, pas dhe gjatë vakteve me një sasi të mjaftueshme lëngjesh (rreth 1 gotë ujë).

Nëse një dozë harrohet, nuk duhet të administrohet një dozë e dyfishtë për të kompensuar dozën e harruar.

Mos e tejkaloni dozën e rekomanduar.

Mos e përdorni produktin pas datës së skadencës.

3. Kundëriindikimet

Salvit Gastricon nuk duhet të përdoret në rast të mbingjeshmërisë ndaj simetikonit ose ndonjë përbërësi tjetër të produktit.

4. Masat paraprake dhe paralajmërimet

Përdorimi i produktit gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji kërkon konsultim mjekësor.

Nëse simptomat ekzistuese vazhdojnë ose përkeqësohen dhe shtaqen simptomat të reja gastrointestinale, rekomandohet një konsultë mjekësore për të përcaktuar shkaku dhe për të filluar trajtimin.

Nuk ka ndërveprime klinike të rëndësishme të barnave të tjera me simetikonin, megjithatë, për shkak të gjasave të ndërveprimeve me barnat, nuk rekomandohet përdorimi i njëkohshëm i Salvit Gastricon me terapi të tjera.

5. Efektet e mundshme anësore

Nuk ka pasur raportime për efekte të padëshiruara të rëndësishme në lidhje me përdorimin e simetikonit. Herë pas here, disa pacientë mund të përjetojnë dhimbje barku, diarree dhe kapsllëk.

Nëse keni ndonjë efekt anësor në lidhje me përdorimin e këtij produkti, raportojni ato te prodhuesi.

6. Siguria e përdorimit

Përmbledhje informacionit rreth sigurisë dhe efikasitetit klinik në dispozicion është në bazën e të dhënave evropiane për pajisjet mjekësore (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Kodi unik i identifikimit të produktit (UDI-DI):

- 15 kapsula: 5904055002871
- 30 kapsula: 5904055002918

Çdo incident serioz që përfshin një produkt duhet t'i raportohet prodhuesit dhe autoritetit kompetent të shtetit anëtar përkatës në të cilin banon pacienti.

7. Kushtet e ruajtjes Salvit Gastricon

Ruajeni në paketimin original, në temperaturën e dhomës (15-25°C), larg fëmijëve.

8. Informacione të tjera

Pajisja mjekësore Salvit Gastricon disponohet në një paketë prej 15, 30 kapsulash të buta.

	Lexoni udhëzimet përpara përdorimit		Pajisje mjekësore
	Numri i lotit		Temperatura e ruajtjes
	Të përdoret përpara datës		Prodhuesi

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland

Informacion rreth pajisjes mjekësore:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, Poland
www.hasco-lek.pl, tel.: +48 22 742 00 22

Përgjegjës për Shqipëri:

Salvus AL Shpk, Rruga Reshit Collaku, Pall. Shalvareve. Shk 4, Ap 44. Tirane, Albania, Tel: +355 689027522

Data e përgatitjes së Udhëzimeve për përdorimin: qershor 2022

