

HemoClin gel

Takojšnje olajšanje pri hemoroidih, fisurah (razpokah) in težavah v predelu analne odprtine
Brzo olajšanje kod hemoroida, fisura (raspuklina) i analnih tegoba
Brzo olajšanje kod hemoroida, fisura i analnih tegoba

HemoClin gel


SI

Enostaven za shranjevanje in za na pot. Ne umaže. Varna in čista oblika.

Izdelka HemoClin® gel ne uporabljajte več kot 30 zaporednih dni.

Ne uporabljajte izdelka, če ste občutljivi na katerokoli od sestavin.

1. korak: Pritisčajte navzdol modri del (B) in se zaustavite, ko se pojavi obroček.



2. korak: Oba dela aplikatorja vstavite v analno odprtino in pritisnite navzdol beli del (A). HemoClin® gel se bo sprostil na prizadeto področje.

- Takojšen hladilni učinek pri hemoroidih in težavah v predelu analne odprtine (npr. srbenje, draženje, pekoč občutek in občutljivost)
- Preprečuje in odpravlja nelagodje v predelu analne odprtine
- Preprečuje nastanek hemoroidov in fisur (razpok)
- Uporabniku prijazen in čist sistem za nanašanje

Za več informacij glejte priloženo navodilo za uporabo.

Opozorila: vsebnik pod tlakom: pri segrevanju lahko poč. **Ne preklanjajte ali sezigajte ga niti po uporabi.** Shranjujte ločeno od toplote/isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne kadite. Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugim vrom vžiga. Ne izpostavljajte temperaturi, višji od 50 °C. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Vsebuje majhne delce. Izdelek z aplikatorjem zaščitite pred sončno svetlobo in ga shranjujte na suhem in hladnem mestu (dobro prezačrtenem). Aerosolni vsebnik uporabljajte samo v kombinaciji s priloženim aplikatorjem.

Zelo lahko vnetljivo. Vsebnik pod tlakom.

Sestavine / Sastojci: Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactarabinan Polyglucuronid Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate. *ZQR

Nosilac upisa u registar u RS:

Medis Pharma d.o.o.,
Milutina Milankovića 11b,
11070 Beograd

Novi Beograd, Srbija

Broj i datum upisa u registar RS:

515-02-02634-15-001 od
21.4.2016

Distributeri u RS:

PHOENIX PHARMA d.o.o., Beograd,
Bore Stankovića 2, 11250 Beograd;
VEGA d.o.o. Valjevo, Vuka Karadžića
41, 14000 Valjevo;
FARMALOGIST d.o.o., Mirjanski
Bulevar 3, 11000 Beograd

Distributer: Medis, d.o.o.,
Bričičeva 1, Ljubljana

Kontakt za RH:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7,
10000 Zagreb, Hrvatska

Zastupnik za BiH: Medis
International d.o.o. Sarajevo,

Ahmeta Muratbegovića 2,
71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

HemoClin gel

HemoClin gel

HR BIH

RS

Jednostavno za čuvanje i nošenje, bez prijanja. Siguran i čist oblik.

HemoClin® gel ne bi trebalo koristiti više od 30 dana zaredom. Ne koristite ovaj proizvod ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak.



1. korak: Pritisnite plavi dio (B) prema dolje i zaustavite se kada se pojavi prsten.

2. korak: Umetnite oba dijela aplikatora u anus i pritisnite bijeli dio (A) prema dolje, tako da HemoClin® gel uđe u zahvaćeno područje.

- Brzo hladi i ublažava analne tegobe (primjerice iritaciju, svrbež, osjećaj žarenja, osjetljivost)
- Tretira i sprječava analne tegobe
- Sprječava nastanak hemoroida i fisura (raspuklina)
- Njeguje kožu i pomaže u prirodnom procesu zacjeljivanja
- Za korisnika ugodan i čist sustav primjene

Za više informacija molimo pročitatte upute za primjenu.

Upozorenje: Spremnik je pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Ne

bošiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. Čuvati odvojen od toplote, iskr, otvorenog plamena i vrućih površina. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C. Čuvajte izvan dohvata djece. Sadržuje male dijelove. Zaštitite sredstvo i aplikator od sunčeve svjetlosti i čuvajte na suhom i hladnom mjestu (dobro prozračenom). Raspršivač se može koristiti samo u kombinaciji s priloženim aplikatorom. Vrlo lako zapaljivo. Sadržaj je pod tlakom.

Jednostavno za čuvanje i nošenje, bez prijanja. Sigurna i čista alternativa.

HemoClin® gel ne bi trebalo koristiti više od 30 dana zaredom. Ne koristite ovaj proizvod ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak.

1. korak: Pritisnite plavi dio (B) prema dolje i zaustavite se kada se pojavi prsten.

2. korak: Umetnite oba dijela aplikatora u anus i pritisnite bijeli dio (A) prema dolje, tako da HemoClin® gel uđe u zahvaćeno područje.

- Brzo hladi i ublažava analne tegobe (npr. iritaciju, svrab, osjećaj peckanja, osjetljivost)
- Tretira i sprječava analne tegobe
- Sprječava nastanak hemoroida i fisura
- Njeguje kožu i pomaže u prirodnom procesu zarastanja
- Za korisnika prijatan i čist sistem primjene

Za više informacija molimo pročitatte uputstvo za upotrebu.

Upozorenje: Boca je pod pritiskom: može eksplodirati ako se zagreva. Ne probadati i ne spaljivati ni nakon uporabe. Držati dalje od toplote, varnica, otvorenog plamena ili vrućih površina. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C. Čuvati van domašaja djece. Sadržuje stine delove. Zaštitite sredstvo i aplikator od sunčeve svjetlosti i čuvati na suvom i hladnom mestu (dobro provetrenom). Dozator se može da koristi samo u kombinaciji sa priloženim aplikatorom. Veoma lako zapaljivo. Sadržaj je pod pritiskom.

Takojšnje olajšanje pri hemoroidih, fisurah (razpokah) in težavah v predelu analne odprtine

Brzo olakšanje kod hemoroida, fisura (raspuklina) i analnih tegoba
Brzo olakšanje kod hemoroida, fisura i analnih tegoba

Gel za hemoroide

Gel za odpravljanje in preprečevanje težav v predelu analne odprtine

45 ml e

www.hemoclin.com



45 ml 89

CE 0481

Izdelovalec / Proizvođač:

YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Nizozemska / Holandija

LOT Glejte dno škatle
Pogledajte dno kutije



Nevarno. Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Opasno. Vrlo lako zapaljiv raspršivač.
Opasno. Veoma lako zapaljivo dozator.

Gel za hemoroide

Gel za tretman i sprječavanje analnih tegoba
Gel za tretman i sprječavanje analnih tegoba

45 ml e

56-34035-2807
16E2



Y/3282/125553