

LECOXEN

zaščitna krema za pomoč pri celjenju

Indikacije: Krema z zaščitnim in vlažilnim delovanjem na poškodovano kožo in perilezijske robove, ki lahko prispeva k oblikovanju optimalnega vlažnega mikrookolja za spodbujanje celjenja ran. Njena uporaba je priporočljiva tudi po zaprtju rane, da preprečimo nastanek motečih brazgotin (keloidov).

Navodila za uporabo

1. Prepričajte se, da je rana čista.
2. Pred nanosom kreme nežno odstranite morebitne izločke.
3. Odstranite pokrovček in iz tube iztisnite primerno količino kreme na prizadeto območje rane in robove rane.
4. Nežno odstranite prekomerno naneseno kremo s čisto gazo. Za najboljši rezultat poskrbite, da bo **Lecoxen krema** v stalnem kontaktu z rano. Če je potrebno, namazano rano prekrijte z oblogo.
5. Po uporabi tubo zaprite s pokrovčkom.
6. **Lecoxen krema** bi morali ponovno nanesti ob naslednji negi (prevezi) oziroma na vsakih 24h, preveriti kako napreduje celjenje rane ali skladno z navodili zdravnika. Za zaščito pred nastankom velikih brazgotin je **Lecoxen krema** priporočljivo uporabljati minimalno 60-90 dni. Večje brazgotine se lahko celijo še dlje. Primerno za otroke po 3. letu starosti. Izdelek se lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

Sestavine: Deionizirana voda, ciklopentasiloksan, dimetikon, tekoči parafin, lavril PEG/PPG-18/18 metikon, dodecen, izostearilni alkohol, kopolimer PEG/PPG-23/50, metilalkil ciklosiloksani, izvleček lubja/semena divjega kostanja (*Aesculus hippocastanum*), propilenglikol, glicerol, natrijev klorid, izvleček čebulice *Allium cepa*, zeolit, benzil alkohol, dehidroocetna kislina, tokoferil acetat, dimetikon krosopolimer, natrijev benzoat, PEG-6 kaprilni/kaprinski gliceridi, izopropil miristat, citronska kislina, BHT, *Triticum vulgare* olje (pšeničnih) kalčkov.



Pri uporabi tega izdelka natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta



Opozorila: Izdelka ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero od sestavin. Prekinite uporabo izdelka v primeru razdraženosti kože. V primeru nanašanja kreme s strani druge osebe, se priporoča uporaba rokavic za enkratno uporabo. Pred uporabo roke dobro umijte. Izogibajte se kontaktu kreme z očmi. Če pride do slučajnega stika kreme z očmi, jih izperite z večjo količino vode. Ne pogoltnite. Hranite izven dosega otrok. Po uporabi izdelek dobro zaprite s pokrovčkom. Izdelek porabite v 6-ih mesecih po odprtju. Samo za zunanjo uporabo. Lecoxen se ne sme nanašati čez dermalna zdravila, razen če je tako svetoval zdravnik. V primeru pojava neželenega učinka prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti (EXP), ki je naveden na tubi.

4°C — 30°C



Shranjevanje: Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, proč od toplotnih virov in svetlobe, pri temperaturi 4°C – 30°C.



LOT

Rok uporabnosti in številka serije (Lot) sta odtisnjena na embalaži



0546

Medicinski pripomoček

Datum revizije: Rev. 3 z dne 05/2024

Pakiranje: Tuba s 15 ml e,

Tuba s 30 ml e, Tuba s 75 ml e



EKUBERG
pharma

Via Tito Schipa, 6, 73020 Carpignano Salentino
(LE) ITALIJA. info@ekubergpharma.com
www.ekubergpharma.com

Distributer: Merit HP d.o.o., Beograjska ulica 4,
1000 LJUBLJANA, Slovenija, www.merit.si **080 15 36**